

翅展 36 mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，前翅各横线不明显，基线、内线、外线均双线黑褐色，环、肾纹只现不完整的黑边，亚端线锯齿形，外侧浅黄；后翅浅灰褐色。雄蛾左右抱钩异形，冠分明，阳茎细长，有细棘形角状器丛及一巨刺形角状器（图 375）。




图 375 单寡夜蛾 *Sideridis simplex* (Staudinger) ♂ 外生殖器

分布 新疆、西藏；中亚地区，克什米尔地区。

健夜蛾属 *Brithys* Hübner

Brithys Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 226.

Type-species: *Noctua pancratii* Cyrillo.

Cocytia Treitschke, 1835, Schmett. Eur. 10 (2): 29.

Glottula Guenée, 1837, Ann. Soc. ent. Fr. 6: 359.

喙不发达，下唇须向上伸，密被鳞片，额平滑，眼大，圆形，雄蛾触角线形；头、胸主要被鳞片，无明显的毛簇；腹部基节背面有毛簇；前翅有副室，3、4 脉或短共柄。

种 检 索 表

- 前翅基区带黑褐色 健夜蛾 *Brithys pancratii*
- 前翅基区铅灰色 毛健夜蛾 *B. crini*

毛健夜蛾 *Brithys crini* (Fabricius) (图版 XX-18)

Bombyx crini Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 587. (Indiae Orientalis)

Brithys crini: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 448.

翅展 36 mm。头、胸暗褐，头顶与颈板基部黑色；前翅铅灰带暗褐色，基线仅前端现一黑纹，内线黑色波浪形，肾纹浅褐灰色，围以红褐环，外线黑色锯齿形，在 3 脉处内突至肾纹后端，其后内斜，亚端线黄白色，间断为新月形点列，线内方一灰黄窄带，其中有一列楔形红褐纹，线外侧暗褐色；后翅白色，前缘区带暗褐色，雌蛾后翅端区亦带褐色；腹部白色带黑褐色。

寄主 蕙兰（据李永禧）。

分布 广西；印度，缅甸，斯里兰卡，新加坡，印度尼西亚。

健夜蛾 *Brithys pancratii* (Cyrillo) (图版 XX-19)

Noctua pancratii Cyrillo, 1787, Ent. Nap. pl. 12, fig. 4. (意大利)

Brithys pancratii: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 447. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 97.

翅展 40 mm。头、胸黑褐色；前翅褐色，基部及前缘区黑褐色，基、内线不明显，黑色，剑纹小，环纹不显，肾纹可见白边，狭窄，外线双线黑色锯齿形，亚端线浅赭色带状，端区黑褐色；后翅白色，前缘区黑褐色；腹部褐色。

寄主 百合科、海滨全能花、文殊兰。

分布 江西、云南；日本，欧洲，非洲。

小眼夜蛾属 *Panolis* Hübner

Panolis Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 214.

Type-species: *Noctua flammea* [Denis et Schiffermüller].

Ilarus Boisduval, 1829, Index Meth. p. 76.

Hilarus Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Index Univ. p. 182, 194.

喙发达，下唇须短，向前伸，有长毛，额平滑，复眼小，雄蛾触角锯齿形，有纤毛丛；头部及胸部只有毛，无毛簇，胫节有长毛；腹部有粗毛，第一节有毛簇，两侧有毛；前翅顶角圆，外缘斜曲，有副室。

雄蛾抱器瓣端部很窄，钩形突端部稍钝。

种 检 索 表

1. 前翅斑纹明晰…………… 东小眼夜蛾 *Panolis exquisita*
- 前翅斑纹模糊…………… 2
2. 前翅棕红色…………… 波小眼夜蛾 *P. pinicortex*
- 前翅赤褐色…………… 松小眼夜蛾 *P. japonica*