

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节短，额平滑无突起，眼大，圆形，雄蛾触角线形；头部与胸部有毛和鳞，无毛簇，胫节外侧有长毛；腹部基节背面有毛簇；前翅有副室。

种 检 索 表

体大，翅展 48mm，前翅一色 灰布冬夜蛾 *Bryopolia chamaeleon*
体小，翅展 36—40mm，前翅中区色暗 绿灰布冬夜蛾 *B. centralasiae*

绿灰布冬夜蛾 *Bryopolia centralasiae* (Staudinger) (图版 XXVI-11)

Polia centralasiae Staudinger, 1882, Stett. ent. Z. 43: 37. (Saisan)

Bryomima centralasiae: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 388. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 112.

翅展 37mm。头、胸灰色杂浅黄色；前翅浅绿灰色，有黄色调，中区黑褐色，基线双线黑色，较粗，内线双线黑色波浪形，剑纹不明显，环纹、肾纹浅黄色，中线、外线黑色锯齿形，后者双线，亚端线浅黄色锯齿形，两侧黑褐色；后翅暗褐色；腹部褐灰色。

分布 新疆；中亚地区，印度。

灰布冬夜蛾 *Bryopolia chamaeleon* (Alpheraky) (图版 XXVI-12)

Polia chamaeleon Alpheraky, 1887, Stett. ent. Zeit, p. 169. (Turkestan)

Bryomima chamaeleon: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 390. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 140. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 113. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.225.

翅展 51mm 左右。头部及胸部淡黄灰色；前翅灰色带淡褐黄色，有暗褐色细点，基线双线黑色，自前缘脉至中室，内线双线黑色，波浪形，在 1 脉处稍显内突，线间色淡，剑纹短而钝，黑边，环纹灰白色黑边，前端开放，内、外缘中部凹，肾纹灰白色，内、外缘黑色，中线黑褐色，波浪形，粗而模糊，外线黑色锯齿形，内斜于肾纹后，外侧衬灰白色，亚端线色淡，锯齿形，内侧有一列黑色锯齿形纹，翅外缘有一列三角形黑点，缘毛灰黄色，中有波浪形暗褐线；后翅淡赭灰色，外线暗褐色外弯，端区带有暗褐色，缘毛淡黄色；腹部灰色带褐色。

分布 新疆；印度，克什米尔地区，中亚地区。

耻冬夜蛾属 *Trichoridia* Hampson

Trichoridia Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 400.