

种 检 索 表

- 前翅亚端线斜直 暗缘干夜蛾 *Busseola submarginalis*
前翅亚端线锯齿形，亚中褶一黑纹 黑纹干夜蛾 *B. longistriga*

黑纹干夜蛾 *Busseola longistriga* (Draudt) (图版 XXXVII-3)

Calamistis lingistriga Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 127, pl. 8, fig. 15. (陕西太白山)

Calamistis longistriga: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 45.

翅展 35 mm 左右。头部灰色杂少许褐色，下唇须外侧褐色，颈板灰色带褐色，端部灰白色；前翅底色灰，带有褐色并有少许黑色细点，基线双线黑色弯曲，只达中室，内线双线黑色，波浪形外斜，至亚中褶处折向内，亚中褶基部有一黑纵线伸达内线，剑纹短小，黑色，环纹灰色黑边，扁圆形，内、外端微尖，肾纹灰色黑边，稍窄，外线黑色，外侧衬灰白色，前半外弯，在 4 脉后内弯，在 6 脉处成一外突小齿，亚端线黑色，锯齿形，不清晰，端线黑色，缘毛灰褐相间；后翅褐灰色，缘毛黄白色；腹部浅褐灰色。

分布 河北、山西、陕西。

暗缘干夜蛾 *Busseola submarginalis* (Hampson) (图版 XXXVII-4)

Ichthyura submarginalis Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 60, pl. 141, fig. 5. (印度)
Calamistis submarginalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 278. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 186.

翅展 30—36 mm。头、胸及前翅浅赭黄色带褐色，前翅布有黑褐细点，基线、内线及外线黑色，内线双线波浪形，外线锯齿形，齿尖为黑点状，环纹小，黄白色，后缘尖，肾纹小，暗褐色，有黄白环，环纹及肾纹有一黑纹连接，亚端线后半可见浅赭黄色内斜，在 1—2 脉间锯齿形，线内侧一黑曲线，较粗，线外侧有一列黑点，翅外缘一列黑点；后翅浅黄带暗褐色；腹部褐色。

分布 西藏；印度。

锹额夜蛾属 *Archanara* Walker

Archanara Walker, 1866, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 35: 1737.

Type-species: *Archanara nonagriella* Walker.

喙不发达，下唇须向前伸，额有叉形突起，复眼圆大，雄蛾触角线形，有纤毛丛；胸部被毛和毛状鳞，无毛簇；腹部基部背面有小毛簇；前翅有副室。