

分布 浙江；印度，印度尼西亚，大洋洲。

暮宇夜蛾 *Avatha noctuoides* (Guenée) (图版LIV-28)

Hypaetra noctuoides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 259. (爪哇)

Hypaetra noctuoides: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 507. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 64, text fig. 17. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 358. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1017.

翅展 39 mm。头部暗褐色，下唇须第一、二节外侧黑棕色；胸部背面暗红褐色，足跗节各节间有黄白斑；前翅暗灰褐色，布有灰色及黑褐色细点，前缘区近基部有一小黑斜纹，其后端缩成一外伸的细钩，内区有 2 黑斑，分别位于前缘区及亚中褶，前者小，后者大，约呈肾形，边缘有黄白细点组成的细线，中线暗褐色，波浪形外弯，肾纹暗灰色，中有黑色细点，内缘微凹，外围黑鳞，外线暗褐色，不明显，自前缘脉后外弯，其后波曲并贴近肾纹，亚端线不清晰，暗褐色，在 7 脉后外凸，在 2—5 脉间锯齿形外弯，其后微弱，端线黑褐色，锯齿形；后翅暗褐色，隐约可见外线与亚端线，端区带有灰色，缘毛基部有一灰白线；腹部暗褐色。

分布 湖南、广东、海南；印度，缅甸，印度尼西亚。

启夜蛾属 *Caenurgia* Walker

Caenurgia Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1464, 1491.

Type-species: *Caenurgia socors* Walker.

Litosea Grote, 1875, Can. Ent. 7: 49.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，额光滑，无突起，上部有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角双栉形或线形，胸部背面无毛簇，各足胫节均具刺；前翅稍长窄，有一副室，后翅中室长约为翅之半，5 脉发达，自中室下角略前发出。

楔斑启夜蛾 *Caenurgia fortalitium* (Tausch) (图版LIV-29)

Noctua fortalitium Tausch, 1809, Mem. Mosc. p. 323, pl. 20, fig. 7. (俄罗斯)

Noctua fortalilium [sic] Hübner, 1818, Eur. Schmett., Noct. fig. 592.

Caenurgia fortalitium: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 66, text fig. 18. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153.

Gonospileia fortalitium: Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 113.

翅展 35 mm。头部与胸部灰色杂褐色；前翅浅灰色，布有暗褐细点，中室后有一褐斑，约呈楔形，其后缘沿 1 脉外伸达 1 脉中部，其外缘中凹，均衬以黑色及白色边，

中室端部有一暗褐近三角形模糊斑块，中室下角有一黑点，其外侧有一白斜纹，外线白色，自前缘脉强外弯，在中褶处内突成一角，外斜至2脉后向内前伸达2脉近基部，外线内侧暗褐色，成一不清晰的宽带，亚端线白色，自前缘脉微外弯，曲度平稳，线内侧衬褐色，前半内侧有黑点，线外侧衬黑褐色，端线黑褐色，缘毛中有二褐线；后翅赭白色，布有褐色细点，外线黄白色，较粗，大锯齿形，亚端线黄白色，微波曲外弯；腹部灰色，布有黑褐细点。

分布 内蒙古、山西；俄罗斯，中亚地区。

拟三角夜蛾属 *Melapia* Sugi

Melapia Sugi, 1968, Kontyu 36: 164.

Type-species: *Pelamia japonica* Ogata.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节约为第二节的2/5，斜形，复眼圆大，额平滑无突起，雄蛾触角双栉形，雌蛾触角线形，胸部被毛和鳞，无毛簇，腹部背面无毛簇，各足胫节具刺，后翅中室约为翅长之半。

种 检 索 表

- 前翅有二黑褐大斑 奇拟三角夜蛾 *Melapia kishidai*
 前翅无黑褐大斑 选拟三角夜蛾 *M. electaria*

选拟三角夜蛾 *Melapia electaria* (Butler) (图版LV-1)

Doryodes electaria Bremer, 1864, Lep. Ost. -Sib. p. 84, pl. 7, fig. 12. (Ussuri)

Mocis electaria: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 77. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359.

Pelamia electaria: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 332, pl. 61f. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 166.

Melapia electaria: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 850.

翅展 35—37 mm。头部与胸部灰白色微带褐色，雄蛾触角双栉形，栉齿黑色；前翅黄白色微带褐色，布有褐色细点，一白色衬褐色的斜线自顶角内斜至亚中褶，折角内伸至翅基部，折角后的线上缘为黑色纵纹，亚端区有一褐线，中室端部有一褐点，端线褐色；后翅黄白色，雌蛾后翅带褐色；腹部灰白色微带褐色。

分布 黑龙江、河北、浙江；日本，朝鲜。

奇拟三角夜蛾 *Melapia kishidai* Sugi (图版LV-2)

Melapia kishidai Sugi, 1968, Kontyu, 36: 165, pl. 4, fig. 1. (Ryukyus 岛)