

Calesia dasyptera: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 580. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

Calesia dasypterus: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 385.

翅展 39 mm。头部红色，头顶黄褐色，触角褐色，复眼后方毛鳞红色，下唇须浅黄色，外侧金莲花色；胸部背面褐色，下胸中部及前、中足胫节外侧金莲花红；前翅灰褐色，无明显斑纹或横线，雄蛾翅前缘近中部有一排竖立的长毛；后翅灰褐色；腹部背面红色，基节灰色。

分布 广东、海南、广西、云南；缅甸，斯里兰卡，印度。

红腹秃胡夜蛾 *Calesia haemorrhoea* Guenée (图版 LXIII-10)

Calesia haemorrhoea Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 258. (印度)

Calesia patna Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 117, fig. 17.

Calesia haemorrhoea: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 579.

Pasipeda haemorrhoea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 385, pl. 70b. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 38—41 mm。头部暗灰褐色，下唇须第二节带赭红色，背缘赭白色；胸部背面暗灰褐色，足基节和胫节有红毛，前足胫节黑褐色，内缘红色，中足胫节外缘红色，各跗节外侧黑褐色；前翅暗褐色，各横线均暗而模糊，隐约可见呈波浪形，亚端线隐约可见在 7 脉处外凸，2—5 脉间外曲弧形；后翅色同前翅，斑纹不清晰，隐约可见波曲外线与亚端线；腹部背面红色，基部几节中央褐色，腹面浅褐色带有红色。

分布 广东、云南；印度，斯里兰卡，缅甸。

亭夜蛾属 *Tinolius* Walker

Tinolius Walker, 1855, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 3: 587, 621.

Type-species: *Tinolius eburneigutta* Walker.

喙发达，下唇须斜向前伸，有毛，雄蛾触角双栉形，雌蛾线形；胸部无毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅短宽，前缘拱曲，有一副室；后翅宽。

幼虫第一、二对腹足发育不全。

种 检 索 表

- 后翅一色绯红 亭夜蛾 *Tinolius eburneigutta*
 后翅基部及后缘绯红，其余黑褐色 四星亭夜蛾 *T. quadrimaculatus*