

斜纹，缘毛黑褐色杂浅褐色；后翅暗褐色，端线黑褐色。

分布 广西；印度。

胡夜蛾属 *Calesia* Guenée

Calesia Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 257.

Type-species: *Calesia comosa* Guenée.

Pasipeda Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1794.

Mecyra Walker, 1865, List. Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 979.

Zirona Walker, 1869, Pro. nat. Hist. Soc. Glasgow, 1: 363.

Asymbata Gerstaecker, 1871, Arch. Naturg. 37 (1): 360.

下喙须向上伸，鳞片平滑，第二节达头顶，第三节长而光滑无鳞，雄蛾触角节间有鬃毛；胸部、腹部及足鳞片平滑；雄蛾前翅中室外前方有一大丛毛，胡须状，无副室；后翅中室很短。幼虫第一及第二对腹退化。

种 检 索 表

1. 前翅中室及亚端区有白斑 伴秃胡夜蛾 *Calesia stillifera*
前翅中室及亚端区无白斑 2
2. 雄蛾前翅前缘区有毛簇 胡夜蛾 *C. dasypterus*
雄蛾前翅前缘区无毛簇 红腹秃胡夜蛾 *C. haemorrhoea*

伴秃胡夜蛾 *Calesia stillifera* Felder et Rogenhofer (图版 LXIII-8)

Calesia stillifera Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 117, fig. 18. (马尼拉)

Pasipeda satellitia Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 184.

Calesia satellitia: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 580.

Pasipeda satellitia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

Calesia stillifera: Poole, 1989, Lep. Cat., Noct. p. 185.

翅展 39 mm。头部暗黄色，触角基节暗黄色，其余黑色，下唇须第三节细长，超过头顶，黑色；胸部背面褐灰色，颈板基部暗黄色，端半部褐灰色，足胫节黄色，外侧端部有一黑斑，跗节外侧黑色，各节间有浅黄色斑；前翅褐色带灰色，中室端部有一白色圆斑，其前内方有一小白圆点，亚端区有一列白色圆形或扁圆形斑，排成波曲形；后翅褐色带灰色，基部色较浅；腹部背面红色，基节灰色。

分布 广东、海南；印度，斯里兰卡，菲律宾。

胡夜蛾 *Calesia dasypterus* (Kollar) (图版 LXIII-9)

Erebus dasypterus Kollar, 1844, Hugel's Kashmir p.476. (Himalaya)