

Callierges ramosa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 93. —Kostrowicki, 1956, Pol. ent. Soc. 27: 37. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 313.

Callierges ramosula: Kononenko, 1979, Rev. ent. URSS. 58 (3): fig. 3.

翅展 33mm。头与颈板灰白色，胸部暗褐色；前翅暗褐灰色，亚中褶一黑纵纹，其前缘在环纹内侧前突成一齿，外端与顶角的黑棕条相合，翅后缘基部一黑纹，中室后有二黑线，翅后缘中段有二黑纹，中室基部一灰白斑，基线、内线仅前端可见，环纹巨大，后部与肾纹相通并扩伸至 2 脉，外端达 4 脉，两纹均白色黑边，外线黑色，亚端区有一列黑尖纹；后翅灰白，端区微褐，翅脉红棕色；腹部褐灰色。

寄主 忍冬属。

分布 黑龙江；欧洲。

德治冬夜蛾 *Callierges draesekei* Draudt (图版 XXIV-3)

Callierges draesekei Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 58, pl. 4, fig. 13; pl. 16, fig. 25. (云南德钦、丽江)

Callierges draesekei: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.224.

翅展 32mm。头部灰色杂有白色，额上部两侧黑色，下唇须灰黑色杂有白色，端部白色；胸部灰色杂有白色，颈板基部黑色，端部白色杂褐色；前翅灰褐色杂黑色，基线黑色，仅在前缘脉处现双短纵纹，亚中褶基部有一黑纹，中室基部有一斜线，黑色，内线黑色，自前缘脉外斜至亚中褶处折角内斜至翅后缘，外线黑色，锯齿形，自前缘脉外斜至 6 脉折角内斜，内侧灰白色，亚端线黑色，在 7 脉处外凸，在 3、4 脉处微呈锯齿形，线外侧衬灰白色，内线、外线之间的亚中褶黑褐色，端线黑色，波浪形，环纹斜椭圆形，黑边，肾纹灰褐色，黑边，环、肾纹之间黑褐色；后翅灰白色，端部灰褐色，缘毛灰白色，中有一褐线；腹部黄褐色带灰色，臀毛簇带红色。

分布 云南、西藏。

标冬夜蛾属 *Calophasia* Stephens

Calophasia Stephens, 1829, Nom. Brit. Ins. p.42.

Type-species: *Noctua linariae* Denis *et* Schiffermuller.

Cleophana Boisduval *et al.*, 1832, Colln iconogr. Hist. Chenill: Noct. pl. 4.

Rhabdophana Sodoffsky, 1837, Bull. Soc. nat. Mosc. 10 (6): 88.

Calliphasia Agassiz. [1848] 1846, Nom. zool. Index Univ. p.59, 61.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘饰长毛，第三节短，向前伸，额平滑无突起，有脊状毛簇，眼大，圆形，雄蛾触角线形；头部与胸部被毛和毛状鳞，头顶有脊状毛簇，颈板端部尖而稍弯，后胸有毛簇；腹部基部几节背面有毛簇，第三节的毛簇较