

形黑线；后翅灰褐色；腹部褐黄色。雄蛾抱器瓣背缘中段稍拱曲（图 500）。

分布 黑龙江、山西、陕西、河南、浙江、湖北、湖南、福建、广西、海南、四川、云南；日本，朝鲜，印度。

迈散纹夜蛾 *Calloplistria maillardi* (Guenée) (图版 XXXIII-13)

Eriopus maillardi Guenée, 1862, Maillard's Reunion Lep. p. 39. (Reunion)

Calloplistria maillardi: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 166.

翅展 26 mm。头、胸褐色，有少许黑、白鳞；前翅暗褐色，有黑褐细点，翅脉微白，后缘基部有黑毛，基线、内线及外线均双线黑色，双线间均白色，内线内方的中室有二白纹，环纹 V 形，肾纹窄，后方一锯齿形黑线，亚端线白色，在 4 脉处外突，端线双线黑色，线间白色，缘毛黑白相间；后翅褐色；腹部灰色，节间白色。

分布 云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，非洲。

白斑散纹夜蛾 *Calloplistria albomacula* Leech (图版 XXXIII-14)

Calloplistria albomacula Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 111. (中国西部: Pu-tsu-fong, Chow-pin-sa)

Eriopus albomacula: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 553. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 195. —Chen, 1982, Het. Sin. 3: 266. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 994.

翅展 26—32 mm。头部及胸部红棕色，额两侧有白斑，头顶及颈板大部黑色，中部各有一横白线，触角基节有白斑，雄蛾触角中部稍粗有鳞簇成齿形，中足胫节、距及第一跗节有长毛；前翅底色微黄，内、外区带桃红色，其余大部带黑色，基线白色，两侧黑色，外弯达 1 脉，内线黑色，两侧衬以白色，环纹窄斜，中央黑色，边缘白色，肾纹白色，中央有黑圈，外半带有红褐色，后端外侧有一小白斑，外线双线黑色，线间白色，亚端线白色，在 6—8 脉间为二内斜纹，4—5 脉间为外斜条伸至端线，4 脉后为细线，端线白色，在 4 脉处为外突齿，缘毛基部白色；后翅褐色；腹部褐色。

分布 广东、海南、四川。

客散纹夜蛾 *Calloplistria exotica* (Guenée) (图版 XXXIII-15)

Eriopus exotica Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. Nat. Ins. 6, 2: 294. (爪哇)

Calloplistria exotica: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 60. —Holloway, 1989, Moths Borneo, p. 167, pl. 5, fig. 22; fig. 295 male genitalia.

Eriopus exotica: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 555, text fig. 127. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 162. pl. 19c.

翅展 30 mm。头、胸红褐带紫并杂有少许黑色；前翅红褐色，除中区后半外均带

紫黑色，基线黑色，内、外线均双线黑色，双线间均白色，内线后段内侧一白纹，其后一黑斑，环纹小，浅黄色，肾纹白色，前方一白纹，中室下角后一黑线，亚端线白色，在顶角后有三白纹，在3脉处一强外突齿；后翅褐灰色，外线褐色波浪形，横脉纹褐色；腹部褐色，节间微白。

分布 海南；印度尼西亚。

弧角散纹夜蛾 *Calloplistria duplicans* Walker (图版XXXIII-16)

Calloplistria duplicans Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 866. (印度)

Calloplistria duplicans: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 785. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 266.

翅展24—30 mm。头、胸褐杂黑色，头顶及颈板大部黑色，中部各有一白横线，雄蛾触角基部1/5处弯曲成弧状，无鳞齿，中、后足胫节及第一跗节有长毛，前翅棕褐色，翅脉淡黄色，基线白色，两侧黑色，内线双线白色，线间黑色，环纹黑色白边，窄斜，肾纹白色，中央有一黑曲条及一褐曲纹，外线双线黑色，线间白色，外侧较宽红褐色，亚端线黄白色，锯齿形，在4脉处齿尖达端线，端线白色；后翅灰棕色，微有黄光；腹部暗褐色。

分布 山东、江苏、浙江、江西、台湾、福建、海南、四川；日本、朝鲜，印度，缅甸。

网散纹夜蛾 *Calloplistria reticulata* (Pagenstecher) (图版XXXIII-17)

Eriopus reticulata Pagenstecher, 1884, J. B. Nass. Ver. 37: 226, pl. 6, fig. 7. (印度尼西亚)

Calloplistria reticulata: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 786. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.264.

翅展25—28 mm。头、胸红褐杂少许白色；前翅灰褐色，基线白色，两侧衬黑棕色，内、外线均双线黑色，双线间均白色，环纹；肾纹白色黑边，前者V形，两纹间一黑斑，亚端线白色锯齿形，内侧衬黑色；后翅污褐色；腹部灰褐色。

分布 海南、西藏；锡金，印度，缅甸，马来西亚，新加坡，印度尼西亚，斯里兰卡。

顶点散纹夜蛾 *Calloplistria apicalis* (Walker) (图版XXXIII-18)

Mosara apicalis Walker, 1855, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 5: 1032. (印度)

Mosara apicalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 485.

Calloplistria apicalis: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 159.

翅展30 mm。头、胸褐色；前翅暗褐色，基线、内线及外线黑色，亚中褶基部一褐