

分布 广东、海南；斯里兰卡。

散纹夜蛾 *Calloplistria juvenina* (Stoll) (图版 XXXIII-8)

Phalaena Noctua juvenina Stoll, 1782, in Cramer, Pap. exot. 4: 245, pl. 300, fig. N. index, p. 250, 1782. (苏里南)

Noctua purpureofasciata Piller, 1783, Solav. Prov. Posega p. 70

Calloplistria juvenina: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 785. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 266.

翅展 30—36 mm。头部棕色杂褐黄；胸部褐黄杂黑棕色；前翅紫棕色，基部微黑，基线白色，只达中室，内线双线黑色，线间白色，弧形外弯，环纹黑色白边，极窄而外斜，肾纹白色，中央有黑窄圈，外线双线黑色，线间紫色，后半内侧较宽的褐黄色，外侧褐色带紫色成带状，亚端线仅前半为三个白色内斜纹及一个白色外斜纹，端线白色，外侧一黑线及棕色粗线，缘毛黑色；后翅淡褐黄色，端区污褐色。

寄主 蕨类。

分布 黑龙江、河南、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广西、海南、四川；日本，印度，欧洲，美洲。

红棕散纹夜蛾 *Calloplistria placodoides* (Guenée) (图版 XXXIII-9)

Eriopus placodoides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. noct. 2: 296. (爪哇)

Calloplistria placodoides: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 256. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 786. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 266.

翅展 30 mm。头、胸及前翅红棕带紫色，前翅后缘基部一橙红色点，基线浅粉紫色，环纹粉紫色围以白圈，较坚直，内线双线黑棕色，后半外侧较大一片粉紫色，中线黑棕色，后半自肾纹后端内斜，肾纹中央粉紫色，白边，外线双线黑棕色，前端为一白点，亚端线白色，后端不显，外侧衬一黑棕线，外线与亚端线间另一黑棕线，前段不显，端线白色，内侧一黑棕线，外侧大部黑棕色；后翅淡棕色，基部淡黄色，缘毛淡褐黄色；腹部浅棕灰色。

寄主 蕨类。

分布 浙江、湖南、福建、海南、云南；印度，马来西亚，印度尼西亚。

沟散纹夜蛾 *Calloplistria rivularis* Walker (图版 XXXIII-10)

Calloplistria rivularis Walker, [1858], 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 867. (印度)

Calloplistria rivularis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 786. —Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 522.

翅展 25 mm。头、胸黄棕色，颈板有黑斑，翅基片有黑环；前翅红棕色，翅脉浅