

形黑线；后翅灰褐色；腹部褐黄色。雄蛾抱器瓣背缘中段稍拱曲（图 500）。

分布 黑龙江、山西、陕西、河南、浙江、湖北、湖南、福建、广西、海南、四川、云南；日本，朝鲜，印度。

迈散纹夜蛾 *Calloplistria maillardi* (Guenée) (图版 XXXIII-13)

Eriopus maillardi Guenée, 1862, Maillard's Reunion Lep. p. 39. (Reunion)

Calloplistria maillardi: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 166.

翅展 26 mm。头、胸褐色，有少许黑、白鳞；前翅暗褐色，有黑褐细点，翅脉微白，后缘基部有黑毛，基线、内线及外线均双线黑色，双线间均白色，内线内方的中室有二白纹，环纹 V 形，肾纹窄，后方一锯齿形黑线，亚端线白色，在 4 脉处外突，端线双线黑色，线间白色，缘毛黑白相间；后翅褐色；腹部灰色，节间白色。

分布 云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，非洲。

白斑散纹夜蛾 *Calloplistria albomacula* Leech (图版 XXXIII-14)

Calloplistria albomacula Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 111. (中国西部: Pu-tsu-fong, Chow-pin-sa)

Eriopus albomacula: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 553. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 195. —Chen, 1982, Het. Sin. 3: 266. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 994.

翅展 26—32 mm。头部及胸部红棕色，额两侧有白斑，头顶及颈板大部黑色，中部各有一横白线，触角基节有白斑，雄蛾触角中部稍粗有鳞簇成齿形，中足胫节、距及第一跗节有长毛；前翅底色微黄，内、外区带桃红色，其余大部带黑色，基线白色，两侧黑色，外弯达 1 脉，内线黑色，两侧衬以白色，环纹窄斜，中央黑色，边缘白色，肾纹白色，中央有黑圈，外半带有红褐色，后端外侧有一小白斑，外线双线黑色，线间白色，亚端线白色，在 6—8 脉间为二内斜纹，4—5 脉间为外斜条伸至端线，4 脉后为细线，端线白色，在 4 脉处为外突齿，缘毛基部白色；后翅褐色；腹部褐色。

分布 广东、海南、四川。

客散纹夜蛾 *Calloplistria exotica* (Guenée) (图版 XXXIII-15)

Eriopus exotica Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. Nat. Ins. 6, 2: 294. (爪哇)

Calloplistria exotica: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 60. —Holloway, 1989, Moths Borneo, p. 167, pl. 5, fig. 22; fig. 295 male genitalia.

Eriopus exotica: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 555, text fig. 127. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 162. pl. 19c.

翅展 30 mm。头、胸红褐带紫并杂有少许黑色；前翅红褐色，除中区后半外均带