

雄蛾触角中段波曲	9
6. 突起稍大，足有长毛	红棕散纹夜蛾 <i>C. placodoides</i>
突起微弱	7
7. 突起前方有长鬃	散纹夜蛾 <i>C. juvenina</i>
突起前方有纤毛	8
8. 前翅外线前半近垂直	沟散纹夜蛾 <i>C. rivularis</i>
前翅外线前半极外斜	白线散纹夜蛾 <i>C. albolineola</i>
9. 雄蛾触角近中部稍膨大	10
雄蛾触角近中部不膨大	红晕散纹夜蛾 <i>C. repleta</i>
10. 雄蛾触角近中部有鳞齿，前方有长纤毛及 4 根长毛	迈散纹夜蛾 <i>C. maillardi</i>
雄蛾触角无鳞齿或长毛	11
11. 雄蛾触角近中部微锯齿形，足胫节及跗基节有长毛	白斑散纹夜蛾 <i>C. albomacula</i>
雄蛾触角近中部微曲	12
12. 中、后足胫节及跗基节有长毛	15
中足胫节有长毛，后足胫节毛中常	网散纹夜蛾 <i>C. reticulata</i>
13. 雄蛾触角双栉形	顶点散纹夜蛾 <i>C. apicalis</i>
雄蛾触角线形	14
14. 前翅外缘中突	脉散纹夜蛾 <i>C. venata</i>
前翅外缘微外弯	嵌白散纹夜蛾 <i>C. quadralba</i>
15. 肾纹后端内突	客散纹夜蛾 <i>C. exotica</i>
肾纹后端微外突	弧角散纹夜蛾 <i>C. duplicans</i>
16. 雄蛾触角突起在基 1/3 处	暗角散纹夜蛾 <i>C. phaeogona</i>
雄蛾触角突起在端 1/3 处	华散纹夜蛾 <i>C. wallacii</i>

华散纹夜蛾 *Calloplistria wallacii* (Felder et Rogenhofer) (图版 XXXIII-4)

Eriopus wallacii Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 110, fig. 26. (印度尼西亚)
Platydasys pryeri Butler, 1892, Proc. zool. Soc. Lond. 1892: 26.
Calloplistria wallacii Holloway, 1989, Malay, Nat. Journ. 38: 166.

翅展 31 mm。头部与胸部红褐色，颈板中部有二黑褐弧线，翅基片外缘有黑纵条，雄蛾触角近端部有一叉突，并波曲，饰毛丛，中、后足胫节及跗节饰极长毛；前翅红褐色，内线，外线间大部带黑色，一斜纹自前缘脉基部外伸至外区亚中褶处，中室外有一黑褐斑，前缘区有几个浅褐纹，外线不明显，前半锯齿形，亚端线褐白色，外侧衬暗褐色，后半不明显，顶角区有一褐白曲纹约达 5 脉；后翅黑褐色；腹部褐色。

分布 广西；印度尼西亚。

暗角散纹夜蛾 *Calloplistria phaeogona* (Hampson) (图版 XXXIII-5)

Eriopus phaeogona Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 535, text fig. fig. 116. (四

川峨眉山)

Eriopus phaeogona: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 194. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 25 mm 左右。头部及胸部淡褐黄色，雄蛾触角 1/3 处有一指状突，其外并有鳞簇成齿形，颈板杂有黑褐色，足胫节及后足第一跗节有长毛，前翅淡褐黄色，前缘基部有一黑斑，基线在前缘脉及中室可见双线黑色，外侧微白，中室处另一白纹，内线双线黑色，线间白色，内侧亚中褶上有一白纹，环纹及肾纹窄，中央黑色，边缘白色，环纹外斜，肾纹内斜，两纹间有一黑棕斑，约呈三角形，其前方另一梯形黑斑，肾纹后有一黑棕色斜条达后缘中部，外线双线黑色，线间白色，亚端线白色，锯齿形，在 6—8 脉较粗而外侧淡褐色，在 4 脉及 3 脉上外突达翅外缘，端线白色，在 4—6 脉间内侧有三角形黑斑，缘毛黑色，中有淡黄线；后翅灰褐色；腹部灰褐色。

分布 浙江、四川。

埃散纹夜蛾 *Callopistria aethiops* Butler (图版 XXXIII-6)

Callopistria aethiops Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 200. (日本)

Eriopus aethiops: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 537—Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 785. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 34.

翅展 28 mm。头、胸灰色杂赭色及少许黑色；前翅灰色带暗红及部分黑色，基区赭黄色，基线黄白衬黑色，内线双线黑色，线间黄白色，前段内侧一黄白纹内斜至中室后，后半外侧一黄白斜条，环纹斜椭圆形，肾纹斜窄，后端内突，后端一白点，两纹间黑色并向前扩展，肾纹后一黑宽条，外线双线黑色，线间黄白色，外侧一灰带，亚端线黄白色锯齿形；后翅灰褐色，基部黄色，中线黑褐色；腹部褐色。

分布 湖南、海南；日本，朝鲜，印度。

白散纹夜蛾 *Callopistria albistrigoides* Poole (图版 XXXIII-7)

Callopistria albistrigoides Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 187.

Steiria albistriga Walker, 1863 1864, J. Proc. Lonn. Soc. Zool. 7: 174. (斯里兰卡)

Eriopus albistriga: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 160.

Callopistria albistriga: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 27 mm。头、胸黑棕色杂灰黄及白色；前翅黑褐色，线纹清晰，翅脉微白，基线黄白色，波浪形，内线双线黄白色带红色，在中脉折角内斜，环纹中央为一黑斜条，边缘黄白色，肾纹黄白色，中央有黑圈，其内缘后端与环纹相接，后端外侧有一黑斑并衬一黄白条，外线双线白色，线间黑褐及紫灰色，亚端线黄白色，在 3、4 脉端部成外突齿，在 2 脉后不显，内侧在 3—5 脉及 6—9 脉各一三角形黑斑；后翅浅黄色，外线与端区褐色；腹部褐灰色。