

紫黑色，基线黑色，内、外线均双线黑色，双线间均白色，内线后段内侧一白纹，其后再一黑斑，环纹小，浅黄色，肾纹白色，前方一白纹，中室下角后一黑线，亚端线白色，在顶角后有三白纹，在3脉处一强外突齿；后翅褐灰色，外线褐色波浪形，横脉纹褐色；腹部褐色，节间微白。

分布 海南；印度尼西亚。

弧角散纹夜蛾 *Callopietria duplicans* Walker (图版XXXIII-16)

Callopietria duplicans Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 866. (印度)

Callopietria duplicans: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 785. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 266.

翅展24—30 mm。头、胸褐杂黑色，头顶及颈板大部黑色，中部各有一白横线，雄蛾触角基部1/5处弯曲成弧状，无鳞齿，中、后足胫节及第一跗节有长毛，前翅棕褐色，翅脉淡黄色，基线白色，两侧黑色，内线双线白色，线间黑色，环纹黑色白边，窄斜，肾纹白色，中央有一黑曲条及一褐曲纹，外线双线黑色，线间白色，外侧较宽红褐色，亚端线黄白色，锯齿形，在4脉处齿尖达端线，端线白色；后翅灰棕色，微有黄光；腹部暗褐色。

分布 山东、江苏、浙江、江西、台湾、福建、海南、四川；日本、朝鲜，印度，缅甸。

网散纹夜蛾 *Callopietria reticulata* (Pagenstecher) (图版XXXIII-17)

Eriopus reticulata Pagenstecher, 1884, J. B. Nass. Ver. 37: 226, pl. 6, fig. 7. (印度尼西亚)

Callopietria reticulata: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 786. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.264.

翅展25—28 mm。头、胸红褐杂少许白色；前翅灰褐色，基线白色，两侧衬黑棕色，内、外线均双线黑色，双线间均白色，环纹；肾纹白色黑边，前者V形，两纹间一黑斑，亚端线白色锯齿形，内侧衬黑色；后翅污褐色；腹部灰褐色。

分布 海南、西藏；锡金，印度，缅甸，马来西亚，新加坡，印度尼西亚，斯里兰卡。

顶点散纹夜蛾 *Callopietria apicalis* (Walker) (图版XXXIII-18)

Mosara apicalis Walker, 1855, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 5: 1032. (印度)

Mosara apicalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 485.

Callopietria apicalis: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 159.

翅展30 mm。头、胸褐色；前翅暗褐色，基线、内线及外线黑色，亚中褶基部一褐