




图 501 顶点散纹夜蛾 *Callopistria apicalis*
(Walker) ♂ 外生殖器

黑斑，内线后端内侧一近三角形褐黑色大斑，环纹不显，肾纹不清晰，前方有二黑纹，外线黑色锯齿形，亚端线浅赭黄色，外侧 8、9 脉间有一黑斑，3、4 脉及 7、8 脉间各一小黑斑；后翅浅黄，端部及后缘区黑褐色；腹部暗褐黄色。雄蛾抱钩斜向背伸（图 501）

分布 云南；印度，斯里兰卡，加里曼丹。

本种后翅四岔型，分类地位待研（见 1146 页默夜蛾）。

脉散纹夜蛾 *Callopistria venata* Leech (图版 XXXIII-19)

Callopistria venata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 111. (湖北长阳)

Eriopus venata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 573.

Callopistria venata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 267.

翅展 31—36 mm。头、胸黑色杂白及浅褐色；前翅褐色，大部带黑色，基部有一白纹，基线、内线白色，内侧在 1 脉前有一白弧纹，后半外侧有一紫色线，环纹及肾纹白色，前者后端尖，肾纹后端外突成钩形。外线双线黑色，线间白色，亚端线为一列白纹，内侧有一些黑斑，翅外缘一列白长点；后翅深褐色，外线微白；腹部灰色。

分布 湖北、浙江、福建；印度。

嵌白散纹夜蛾 *Callopistria quadralba* (Draudt) (图版 XXXIII-20)

Eriopus quadralba Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 107, pl. 7, fig. 14. (云南德钦，四川巴塘)

Callopistria quadralba: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 267.