

雄蛾触角中段波曲	9
6. 突起稍大，足有长毛	红棕散纹夜蛾 <i>C. placodoides</i>
突起微弱	7
7. 突起前方有长鬃	散纹夜蛾 <i>C. juvenina</i>
突起前方有纤毛	8
8. 前翅外线前半近垂直	沟散纹夜蛾 <i>C. rivularis</i>
前翅外线前半极外斜	白线散纹夜蛾 <i>C. albolineola</i>
9. 雄蛾触角近中部稍膨大	10
雄蛾触角近中部不膨大	红晕散纹夜蛾 <i>C. repleta</i>
10. 雄蛾触角近中部有鳞齿，前方有长纤毛及 4 根长毛	迈散纹夜蛾 <i>C. maillardi</i>
雄蛾触角无鳞齿或长毛	11
11. 雄蛾触角近中部微锯齿形，足胫节及跗基节有长毛	白斑散纹夜蛾 <i>C. albomacula</i>
雄蛾触角近中部微曲	12
12. 中、后足胫节及跗基节有长毛	15
中足胫节有长毛，后足胫节毛中常	网散纹夜蛾 <i>C. reticulata</i>
13. 雄蛾触角双栉形	顶点散纹夜蛾 <i>C. apicalis</i>
雄蛾触角线形	14
14. 前翅外缘中突	脉散纹夜蛾 <i>C. venata</i>
前翅外缘微外弯	嵌白散纹夜蛾 <i>C. quadralba</i>
15. 肾纹后端内突	客散纹夜蛾 <i>C. exotica</i>
肾纹后端微外突	弧角散纹夜蛾 <i>C. duplicans</i>
16. 雄蛾触角突起在基 1/3 处	暗角散纹夜蛾 <i>C. phaeogona</i>
雄蛾触角突起在端 1/3 处	华散纹夜蛾 <i>C. wallacii</i>

华散纹夜蛾 *Callopistria wallacii* (Felder et Rogenhofer) (图版 XXXIII-4)

Eriopus wallacii Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 110, fig. 26. (印度尼西亚)
Platydasys pryeri Butler, 1892, Proc. zool. Soc. Lond. 1892: 26.
Callopistria wallacii Holloway, 1989, Malay, Nat. Journ. 38: 166.

翅展 31 mm。头部与胸部红褐色，颈板中部有二黑褐弧线，翅基片外缘有黑纵条，雄蛾触角近端部有一叉突，并波曲，饰毛丛，中、后足胫节及跗节饰极长毛；前翅红褐色，内线，外线间大部带黑色，一斜纹自前缘脉基部外伸至外区亚中褶处，中室外有一黑褐斑，前缘区有几个浅褐纹，外线不明显，前半锯齿形，亚端线褐白色，外侧衬暗褐色，后半不明显，顶角区有一褐白曲纹约达 5 脉；后翅黑褐色；腹部褐色。

分布 广西；印度尼西亚。

暗角散纹夜蛾 *Callopistria phaeogona* (Hampson) (图版 XXXIII-5)

Eriopus phaeogona Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 535, text fig. fig. 116. (四