

一点顶夜蛾 *Callyna monoleuca* Walker (图版XXXVIII-4)

Callyna monoleuca Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1667. (印度)

Callyna monoleuca: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 366. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 196. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 278.

翅展 36—50 mm。头、胸及前翅暗棕色，有少许白点，前翅基、内线均由浅褐点组成，波浪形，环纹圆形黑边，肾纹中央有褐黄点，外缘有褐黄细点，前缘有灰色细点，外线黑色，在翅脉上有黑短纹，线外侧有赭褐斑，后半段外侧红棕色，亚端线黑色，外侧红棕色，顶角一白斑，其后半有一圆形黄斑，前半中央一褐点，翅外缘一列白点；后翅黑棕带红色；腹部黑棕色。

分布 海南、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚等。

耀夜蛾属 *Opsyra* Hampson

Opsyra Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 15.

Type-species: *Callyoa chalcoela* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节短，额光滑，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞，前、后胸有毛簇；腹部基节背面有一毛簇；前翅有一副室，后翅 5 脉细弱。

耀夜蛾 *Opsyra chalcoela* (Hampson) (图版XXXVIII-5)

Callyna chalcoela Hampson. 1902, J. Bomb. Soc. 14: 208. (锡金)

Opsyra chalcoela: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 445.

翅展 33 mm。头与颈板黄色，额有褐斑；胸部白色；前翅黑褐色，外线外方除顶角外均浅黄色，后缘区浅黄，有暗绿及金色感，前缘区有银蓝色点，基线、内线及外线银蓝色，无环纹，肾纹圆形，中央一银白点，外线中段黄白色，外侧有黑点，端线白色；后翅黄白带褐色，外线与亚端线后段可见黑色，端线为一列黑长点；腹部褐黄，基部黄白色。

分布 福建、四川；锡金。

丽夜蛾亚科 CHLOEPHORINAE

喙多发达，下唇须一般较长，第三节可能很长，且端部膨大，多数成尖齿形向下伸，额光滑，少数有尖突，复眼大，无纤毛或睫毛，触角多为线形，少数较扁或栉形，胸部主要被毛，少有毛簇，足胫节无刺亦无爪，有些种类后足胫节极短，距亦不发达。