

平嘴壶夜蛾 *Calyptra lata* (Butler) (图版 LXII-25)

Calpe lata Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 21. (日本东京)

Oraesia lata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 384. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 371.

Calyptra lata: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 862. ——Banziger, 1983, Ent. Scand. 14: 476.

翅展 47 mm。头、胸及腹部灰褐色；前翅黄褐带紫红色，基线、内线及中线深棕色，肾纹仅外缘明显深棕色，一红棕线自顶角内斜至后缘近中部，亚端区有二暗褐曲线，在翅脉上为黑点；后翅浅黄褐色，外线及端区暗褐色。雄蛾抱器腹延伸至瓣端并折向背，近中部一突起，但左右瓣的此突异形（图 663）。

寄主 柑桔、紫堇、唐松草。

分布 黑龙江、河北、山东、福建、云南；日本，朝鲜。




图 663 平嘴壶夜蛾 *Calyptra lata* (Butler)
♂ 外生殖器




图 664 壶夜蛾 *Calyptra thalictri*
(Borkhausen) ♂ 外生殖器

壶夜蛾 *Calyptra thalictri* (Borkhausen) (图版 LXII-26)

Phalaena Bombyx thalictri Borkhausen, 1790, Naturg. Eur. Schmett. 3: 425. (未注明模式产地)

Calpe capuzina var. *centralitalica* Dannehl, 1925, Ent. Z. 39: 12.

Calpe capucina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 382.

Calyptra capucina: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 371.

Calyptra thalictri: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 861. ——Banziger, 1983, Ent. Scand. 14: 478.

翅展 46 mm。头、胸褐色杂有灰白色；前翅褐色有粉红细纹，各横线棕色，环、