

多型种。手头标本为一暗色型。

### 暗逸夜蛾 *Caradrina fusca* Leech (图版 XXXV-31)

*Caradrina fusca* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 118. (四川康定)

*Athetis fusca*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 328. ——Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.232.

翅展 31—36 mm。头、胸灰白杂黑褐色；前翅灰白杂褐色，基线黑色波曲，内线褐黑色波浪形外斜，前端为黑点，环纹不显，肾纹窄，黑褐色，内缘有褐点，外缘前后各有浅褐点，中、外线暗褐色，后者锯齿形，亚端线灰白色波浪形，端线黑褐色；后翅褐白，端线黑褐色；腹部灰褐色。

**分布** 四川、西藏。

### 暮逸夜蛾 *Caradrina morosa* (Lederer) (图版 XXXV-32)

*Charadrina morosa* Lederer, 1853, Verh. zool. -bot. Ges. Wien. p. 375. Pl. 5, fig. 3. (西伯利亚)

*Athetis morosa*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 328. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 38.

*Caradrina* (*Eremodrina*) *morosa*: Varga, 1982, Folia ent. Hung. 43 (1): 221.

翅展 34 mm。头、胸白色带浅褐色；前翅浅灰黄带褐色，基线黑色间断，内线、中线及外线黑色，前者双线锯齿形，环纹为一黑点，肾纹黑色窄曲，内缘后端一白点，外侧二白点，中线模糊，外线锯齿形，亚端线白色波浪形，与外线间暗褐色，前缘有九个灰黄点；后翅白色带褐，翅脉与端区色暗；腹部灰色。

**分布** 黑龙江、新疆、河北；蒙古，俄罗斯。

### 侨逸夜蛾 *Caradrina flavirena* Guenée (图版 XXXV-33)

*Caradrina kadenii* var. *flavirena* Guenée, 1852, in Boisduval *et* Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 1: 250. (未注明模式产地)

*Athetis flavirena*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 331. ——Boursin, 1933, Mitt. munch. ent. Ges. 23: pl. 6, figs. 5, 6.

翅展 30 mm。头、胸浅赭白色，后胸红褐色；前翅浅褐，有灰色感，基线、内线、中线及外线黑色，后者锯齿形，其余各线波浪形，环纹为一黑褐点，肾纹黑褐色，外围若干小白点，外缘中部一黄点，亚端线不明显，浅褐黄色锯齿形，两侧黑褐色；后翅褐白色；腹部赭白带褐色。雄蛾抱器瓣端二叉，背缘有二钝齿突 (图 527)。

**寄主** 药用蒲公英。

**分布** 西藏；亚洲西部，欧洲，非洲北部。