

种 检 索 表

1. 肾纹围以白点 2
 肾纹不围白点 7
2. 前翅中线前端有黑斑 3
 前翅中线前端无黑斑 白点逸夜蛾 *Caradrina albina*
3. 前翅外区带黑褐色 4
 前翅一色 5
4. 前翅端区黑褐色 暗逸夜蛾 *C. fusca*
 前翅端区不带黑褐色 暮逸夜蛾 *C. morosa*
5. 前翅无黑褐点 侨逸夜蛾 *C. flavirena*
 前翅布黑褐点 6
6. 后翅带褐色 藏逸夜蛾 *C. himalayica*
 后翅白色 穗逸夜蛾 *C. clavipalpis*
7. 雄蛾抱钩基部分叉 邻逸夜蛾 *C. vicina*
 雄蛾抱钩端部分叉 华逸夜蛾 *C. eutapaishana*

邻逸夜蛾 *Caradrina vicina* Staudinger (图版 XXXV - 29)

Caradrina vicina Staudinger, 1870, Berl. ent. Z. p. 118. (Sarepta)

Athetis vicina: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 355.

翅展 30—34 mm。头、胸及前翅赭白色，前翅微带褐色，端区黑褐色，基线仅前端及中室处现黑点，内线黑色，后半锯齿形，前端为黑点，中线黑色，后半锯齿形，前端为黑纹，环纹为一黑点，肾纹黑色新月形，外线黑色，7脉后锯齿形，亚端线白色锯齿形，间断；后翅白色，翅脉及外缘褐色；腹部白色。

分布 新疆；中亚地区，亚洲西部，欧洲。

白点逸夜蛾 *Caradrina albina* Eversmann (图版 XXXV - 30)

Caradrina albina Eversmann, 1848, Bull. Mosc. 3: 215. (Urals)

Athetis albina: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 340.

Platyperigea albina: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmiett. Mitteleur. p. 105.

翅展 32—34 mm。头、胸及前翅灰色带褐色，前翅有细黑点，外线外方色暗，基线仅前端现一黑纹，内线仅现几个黑点，环纹不显，中线仅前端现一黑斜纹，肾纹黑褐色，内缘有二白点，外缘有三个白点，外线不明显，前端为黑点，亚端线灰白色，翅外缘一列黑灰点；后翅白色，外缘一列灰点；腹部灰白色。

分布 青海、新疆；中亚地区，亚洲西部，俄罗斯。