

# 白裙赭夜蛾 *Carea angulata* (Fabricius) (图版XXXIX-9)

*Bombyx angulata* Fabricius, 1793, Ent. Syst. 3: 481. (India Orientali)

*Dabarita subtilis* Walker, 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 10: 479.

*Carea innocens* Swinhoe, 1918, Ann. nat. Hist. 2: 73.

*Carea intermedia* Swinhoe, 1918, Ann. nat. Hist. 2: 73.

*Carea subtilis*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 542. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322.

翅展 31—46 mm。头、胸及前翅赭红色，前翅部分带有紫色，内线、外线褐色双线，内线较直，外线内侧褐色似呈三角斑，肾纹为一黑点，翅外缘后半凹；后翅白色，外缘大部带桃红色；腹背褐白色。雄蛾抱器瓣背缘波曲（图 565）。




图 565 白裙赭夜蛾 *Carea angulata* (Fabricius) ♂ 外生殖器

**寄主** 番樱桃属。

**分布** 广东、海南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚等。

# 绿斑赭夜蛾 *Carea chlorostigma* Hampson (图版XXXIX-10)

*Dabata chlorostigma* Hampson, 1893, Ill. Het. Br. Mus. 9: 101, pl. 159, fig. 12. (斯里兰卡)

*Carea chlorostigma*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 422. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 543. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 430, pl. 41c. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 23. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 94.

翅展 25 mm。头部与颈板基部黄色杂黑褐色，触角褐色，颈板中部有一黑绿宽带，端部灰褐色；胸部紫灰色带红褐色，下胸与足腿节白色，胫节与跗节黄色杂黑褐色，前翅紫灰带红褐色，布有零星黑点，亚端线内方的前缘区暗棕色，内线不明显，暗褐色，



剑纹大，似馒头形，墨绿色，白边，环纹近圆形，墨绿色，白边，肾纹色似环纹，外缘中凹，外线暗褐色，不明显，在中褶及亚中褶处内凹，缘毛深棕色；后翅白色带棕红色，端区色深；腹部灰色带褐色，第二节背毛簇及臀毛簇红褐色，腹面白色。

**分布** 海南；斯里兰卡，东南亚。

### 曲缘赭夜蛾 *Carea tumida* Hampson (图版XXXIX-11)

*Carea tumida* Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 594. (Borneo)

*Carea tumida*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 547, pl. 188, fig. 30. — Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 431, pl. 41e. — Barlow, 1982, Moths SE Asia, p. 95.

翅展 40 mm。头、胸及前翅红棕色，额有黑条纹，颈板基部白色，其上有黑条纹，前翅前缘中段凹，大部有灰色光泽，基线仅中室前为黑纹，内线、外线黑色，后者双线，环纹、肾纹无，亚端线隐约可见；后翅火红色，后缘区黑灰褐色；腹部污褐色，腹面红棕色。

**分布** 海南；东南亚。

### 赭夜蛾 *Carea varipes* Walker (图版XXXIX-12)

*Carea varipes* Walker, 1857 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 10: 475. (马亚西亚)

*Carea varipes*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 547. — Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 431. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322.

翅展 42—46 mm。头、胸及前翅土红色，前翅在外线外方带有银灰色光泽，中室端部有黑点，外线双线黑褐色，微内弯，自前缘脉至臀角，内侧有一黄棕色带，前宽后窄；后翅赭黄色；腹部浅红褐色。

**寄主** 桃金娘。

**分布** 广东、海南；印度，印度尼西亚，马来西亚，新加坡。

### 斜线赭夜蛾 *Carea dione* Swinhoe (图版XXXIX-13)

*Carea dione* Swinhoe, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 15: 159. (印度卡西亚山)

*Carea dione*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 552. — Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 432, pl. 41f.

翅展 38 mm。头部霉褐色，额与下唇须外侧紫褐色；胸部背面紫褐色，颈板与翅基片霉褐色，下胸白色，足外侧带有褐色；前翅淡紫褐色，基部、中外线间及顶角区带有绿褐色，内线黑色，较直外斜至后缘中部，外线色浅，近直线外斜，亚端线暗褐色，不整齐锯齿形，缘毛深棕色，但 1—2 脉端部的缘毛基半部浅黄色，端部白色；后翅白色微黄，后缘区褐色；腹部红褐色。