

分布 海南；印度。

橙后赭夜蛾 *Carea sabulosa* Warren (图版XXXIX-14)

Carea sabulosa Warren, 1916, Nov. zool. 23: 223. (锡金；印度阿萨姆)

Carea sabulosa: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 439, pl. 41A d.

翅展 40 mm。头部及胸部红棕色，中、后足胫节有灰褐毛；前翅红棕色，各横线不清晰，内线黑褐色，微波浪形外斜，后端达翅后缘中部，肾纹只现一黑褐点，外线黑褐色，在中褶与亚中褶处稍内弯，亚端线黑褐色，在中褶处内弯，在 3 脉后较内斜，后端与外线后端接近；后翅赭红色，后缘区暗褐灰色；腹部红棕色。

分布 福建；印度，锡金。

白缘赭夜蛾 *Carea leucocraspis* Hampson (图版XXXIX-15)

Carea leucocraspis Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 596. (Borneo)

Carea leucocraspis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 557, pl. 189, fig.

1. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 436, pl. 42b. —Chen, 1982, Icon.

Het. Sin. 3: 323. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1019.

翅展 35 mm。头部与胸部深褐色，前足胫节与跗节前缘白色，中足胫节基部白色；前翅淡棕色，微带紫色，前缘脉微白，内线不明显，暗褐色，自前缘脉外斜至亚中褶，外线隐约可见，暗褐色，在前缘脉后及 2—5 脉间外弯，亚端线极微弱，暗褐色，波浪形；后翅火红色，后缘区灰褐色；腹部深褐色。

分布 广东、海南、云南；斯里兰卡，印度尼西亚。

浪赭夜蛾 *Carea metaphaea* Hampson (图版XXXIX-16)

Carea metaphaea Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 558, pl. 189, fig. 4. (Sarawak)

Carea metaphaea: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 435, pl. 42b.

翅展 45 mm。头部红棕色，下唇须白色，外侧带红棕色；胸部背面红棕色，下胸白色，足白色，外侧布有黑褐点；前翅红棕色，前缘白色，内线隐约可见暗褐色，波曲外斜，肾纹只现一暗点，外线暗褐色，二曲形，外弯于 7—8 脉及 3、4 脉处，在中褶处内弯，亚端线暗褐色，二曲形，曲度与外线相似；后翅红棕色，后缘区暗灰褐色；腹部红棕色带灰色。

分布 海南；印度尼西亚。

波赭夜蛾 *Carea fasciata* (Moore) (图版XXXIX-17)

Ranaja fasciata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 121, pl. 4, fig. 18. (大吉岭)