

寄主 豆科。

分布 黑龙江、内蒙古、河北、陕西、浙江、云南；日本。

客夜蛾属 *Catephia* Ochsenheimer

Catephia Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 94.

Type-species: *Noctua alchymista* [Denis et Schiffermuller].

Idicara Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc. (Zool.) 7: 172.

Zarima Moore, 1882, Lep. Atk. p. 162.

Mageutica Hampson, 1926, Descr. New Gen & Spec. Noct. Br. Mus. p. 64.

喙发达，下唇须向上伸，微弯，第三节细，胸部被毛，触角线形，雄蛾前足或有长而密的毛簇，腹部背面有一列毛簇，前翅前后缘亚平行，后翅外缘后半微凹。

种 检 索 表

- 翅黑棕色杂褐色，中室后有白斑 白斑客夜蛾 *Catephia albomacula*
翅浅褐黄色，顶角及后缘区焦黑 黄衣客夜蛾 *C. flavescens*

白斑客夜蛾 *Catephia albomacula* (Draeseke) (图版 LX-12)

Anophia albomacula Draeseke, 1928, Ent. Ver. Iris Dresden 42: 317. (峨眉山)

Anophia albomacula: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 228.

Arcte albomacula: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 166.

翅展 35 mm。头部与胸部黑棕色杂有少许褐色及褐灰色，颈板有一黑横线，足跗节各节间有白斑；前翅黑棕色杂褐色，基线黑色，自前缘脉至亚中褶，内线双线黑色，波浪形外弯，在 1 脉内凸成齿，线间褐色，环纹淡褐色，不明显，肾纹外半分割为 3 个小白斑，黑边，后方有一黄白色三角形斑，外线双线黑色，微锯齿形，自前缘脉外弯，5 脉后内斜，外一线粗而模糊，外区前缘脉有一列黄白点，亚端线浅褐黄色，不规则锯齿形，内侧各翅脉间有一齿形黑纹，端线由一列齿形黑点组成；后翅淡褐黄色，端区有一黑褐带，前宽后窄，缘毛黑褐色，基部与端部灰色；腹部黑褐色。

分布 浙江、湖南、四川、云南。

黄衣客夜蛾 *Catephia flavescens* Butler (图版 LX-13)

Catephia flavescens Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 74. (印度)

Catephia flavescens: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 482. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 555.

Anophia flavescens: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 377, pl. 68i. —Chen,