

寄主 豆科。

分布 黑龙江、内蒙古、河北、陕西、浙江、云南；日本。

客夜蛾属 *Catephia* Ochsenheimer

Catephia Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 94.

Type-species: *Noctua alchymista* [Denis et Schiffermuller].

Idicara Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc. (Zool.) 7: 172.

Zarima Moore, 1882, Lep. Atk. p. 162.

Mageutica Hampson, 1926, Descr. New Gen & Spec. Noct. Br. Mus. p. 64.

喙发达，下唇须向上伸，微弯，第三节细，胸部被毛，触角线形，雄蛾前足或有长而密的毛簇，腹部背面有一列毛簇，前翅前后缘亚平行，后翅外缘后半微凹。

种 检 索 表

- 翅黑棕色杂褐色，中室后有白斑 白斑客夜蛾 *Catephia albomacula*
翅浅褐黄色，顶角及后缘区焦黑 黄衣客夜蛾 *C. flavescens*

白斑客夜蛾 *Catephia albomacula* (Draeseke) (图版 LX-12)

Anophia albomacula Draeseke, 1928, Ent. Ver. Iris Dresden 42: 317. (峨眉山)

Anophia albomacula: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 228.

Arcte albomacula: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 166.

翅展 35 mm。头部与胸部黑棕色杂有少许褐色及褐灰色，颈板有一黑横线，足跗节各节间有白斑；前翅黑棕色杂褐色，基线黑色，自前缘脉至亚中褶，内线双线黑色，波浪形外弯，在 1 脉内凸成齿，线间褐色，环纹淡褐色，不明显，肾纹外半分割为 3 个小白斑，黑边，后方有一黄白色三角形斑，外线双线黑色，微锯齿形，自前缘脉外弯，5 脉后内斜，外一线粗而模糊，外区前缘脉有一列黄白点，亚端线浅褐黄色，不规则锯齿形，内侧各翅脉间有一齿形黑纹，端线由一列齿形黑点组成；后翅淡褐黄色，端区有一黑褐带，前宽后窄，缘毛黑褐色，基部与端部灰色；腹部黑褐色。

分布 浙江、湖南、四川、云南。

黄衣客夜蛾 *Catephia flavescens* Butler (图版 LX-13)

Catephia flavescens Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 74. (印度)

Catephia flavescens: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 482. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 555.

Anophia flavescens: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 377, pl. 68i. —Chen,

1982, Icon. Het. Sin. 3: 367. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.354. —Chen, 1992, *in* Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1025.

翅展 37—40 mm。头部褐黄色，额有一黑横纹；胸部背面黑色，颈板中部有一黑横线，下胸褐黄色，足褐色，跗节各节间有褐黄斑，翅基片红棕色，中央黑色；前翅浅褐黄色，后缘区焦黑色，基线仅在前缘区现双黑纹，内线双线黑色，波浪形外斜，剑纹棕色，黑边，环纹大，有清晰的黑边线，中央暗褐色，肾纹大，前窄后宽，色似环纹，中线粗而模糊，自前缘脉外斜至肾纹内侧，其后不显，外线双线黑棕色，锯齿形，自前缘脉外弯，3脉后明显内弯，亚端线不清晰，浅褐黄色，内侧在6脉前有一黑褐色斑，4脉后两侧带暗棕色，翅外缘有一列模糊棕色点，缘毛黑棕色与浅褐黄色相间；后翅淡黄色，横脉纹褐色，端区有一黑褐宽带，顶角至4脉有一黄色窄条，此处缘毛黄色，其余黑褐色；腹部背面黑色带黄色，腹面褐黄色。

分布 福建、云南、西南；印度等。

默夜蛾属 *Mosara* Walker

Mosara Walker, 1855, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 5: 1032.

Type-species: *Mosara apicalis* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第三节达头顶，额光滑无突起，雄蛾触角双栉形；胸部被毛；腹部中部几节背面有小毛簇，雄蛾有发达的臀毛簇；前翅后缘近基部后突，臀角处有小鳞齿；雄蛾后翅反面有一脊和皱褶，自前缘中部至中室端折向翅外缘。

默夜蛾 *Mosara apicalis* Walker (图版 LX-17)

Mosara apicalis Walker, 1855, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 5: 1032. (印度北部)

Plusia inaperta Walker, [1863] 1864, J. Proc. Linn. Soc. (zool.) 7: 71.

Anophia latteralis Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 917.

Callopietria apicalis: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 159.

翅展 30 mm。头部与胸部暗褐色，雄蛾触角双栉形；前翅暗褐色，斑纹不明显，隐约可见黑色内外线，微波曲外弯，肾纹不清晰，中有一白点，亚端线赭黄色，外弯，线外方色稍浅，近顶角有二黑纹，外缘近中段有二齿形黑纹，端线由一系列黑点组成；后翅基半部黄白色，端半部黑褐色；腹部暗褐色。

本种暂移置 *Callopietria* 属，改称顶点散纹夜蛾。

斑翅夜蛾属 *Serrodus* Guenée

Serrodus Guenée, 1852, *in* Boisduval *et* Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 3: 174.