

静裳夜蛾 *Catocala desiderata* Staudinger (图版 XLV-3)

Catocala desiderata Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. 49: 59. (乌兹别克; 伊犁地区)

Catocala desiderata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 82, pl. 196. fig. 7. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 310, pl. 56c.

翅展 56mm。头部与胸部灰白色杂有黑褐色, 头顶有 V 形黑纹, 额两侧有黑斑, 下唇须第二节外侧端半部与第三节密布黑点, 颈板中部有 2 黑横纹, 端部白色, 前胸背面有一黑条, 下胸与足白色, 跗节外侧杂黑色; 前翅灰白色带浅褐色, 基线黑色, 自前缘脉外弯达中室, 亚中褶基部有一黑纵纹, 内线黑色, 在前缘区较粗, 其后细弱, 波曲外斜, 线内侧在中脉后有一黑纵纹, 环纹不显, 肾纹微黑, 其外缘锯齿形, 前方有一黑斑, 后方有一灰白斑, 外线在前缘区为一黑斑, 9 脉后外斜, 在 4—6 脉间为强外突齿, 其后细锯齿形并细弱而间断, 亚端线不明显, 端区翅脉纹微黑; 后翅红色, 中部有一黑色微波曲窄带, 其外缘在 5 脉处稍外突, 后端达亚中褶, 端区有一黑带, 其内缘在 2 脉处内突, 在亚中褶处窄缩, 其外缘前段不达顶角, 翅外缘顶角处及缘毛白色, 缘毛大部间有黑色; 腹部灰色微带褐色。

分布 甘肃、新疆; 中亚地区。

红腹裳夜蛾 *Catocala pacta* (Linnaeus) (图版 XLV-4)

Phalaena Noctua pacta Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 512. (欧洲)

Catocala pacta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 74. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 310, —Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmiett. Mitteleur. p. 284. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 345.

翅展 43—48mm。头与颈板灰白杂少许褐色, 后者有黑褐横线, 头顶有 V 形黑纹; 胸部赤褐杂少许白色, 后胸黑褐色; 前翅赭灰色, 基线、内线黑色, 肾纹中央一黑纹, 黑边, 后方一灰斑, 以一暗线与外线相连, 外线黑色锯齿形, 亚端线褐色锯齿形, 端线为一列黑点; 后翅绯红, 中带黑色外弯至亚中褶, 端带黑色, 前宽后窄, 缘毛白色; 腹部背面绯红, 基部、端部及腹面白色。

寄主 柳。

分布 黑龙江、新疆; 蒙古, 欧洲。

连裳夜蛾 *Catocala juncta* Staudinger (图版 XLV-5)

Catocala juncta Staudinger, 1889, Stett. ent. Z. p. 59. (伊犁地区)

Catocala juncta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 79, pl. 196, fig. 1. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 309, pl. 56b.

翅展 52mm。头部与胸部黄褐色杂黑褐色, 额两侧有黑斑, 下唇须灰白色, 第二节