

翅展 60mm。头、胸黑棕杂少许灰色；前翅灰色，密布深棕及黑色细点，内线内侧和外线外侧棕色，约似带状，基线、内线及外线均黑色，内线波浪形外斜，肾纹灰白色，中有褐环，后方一白斑，其後一波浪形黑棕线，肾纹前有一黑条，外线锯齿形，亚端线灰白色锯齿形；后翅黄色，中带与端带黑色，亚中褶一黑纵条；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣端尖，阳茎细长（图 605）。

寄主 藤。成虫吸食梨果汁。

分布 黑龙江、宁夏、浙江、江西、福建；日本，印度。

显裳夜蛾 *Catocala deuteronympha* Staudinger (图版 XLVI-9)

Catocala deuteronympha Staudinger, 1861, Stett. ent. Z. p. 290. (Kiachta)

Catocala omphale Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 195.

Catocala deuteronympha: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 124. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 311. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 346.

翅展 58—61mm。头、胸棕色杂灰白及少许黑色，额、颈板及翅基片有黑纹；前翅灰白色，内线以内带暗棕色，中区带黑褐色，端区带红褐色，基中褶基部一黑纵纹，基线、内线及外线均黑色，内线波浪形外斜，外侧一白斜条，肾纹灰色黑边，其外缘锯齿形，中有黑环，外线在 4—6 脉间成二巨齿，其后波浪形，亚端线灰色锯齿形，端线为一系列衬白的黑点；后翅黄色，中带与端带黑色；腹部烟褐色。

分布 黑龙江、河北、福建；日本，俄罗斯。

茂裳夜蛾 *Catocala doerriesi* Staudinger (图版 XLVI-10)

Catocala doerriesi Staudinger, 1888, Stett. ent.

Z. p. 271. (Raddefskaja; Ussuri)

Catocala doerriesi: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 135. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 312. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 347.

翅展 60mm。头、胸黑棕杂灰白色；前翅灰棕杂灰色，亚中褶基部一黑纹，基线、内线及外线黑色，内线双线波浪形，肾纹褐灰色，中有黑环，后方一灰白斑，外线后半锯齿形，在亚中褶内伸成黑纵条，线内侧一白纹，亚端线白色锯齿形，端线为一系列黑点；后翅黄色，中带与端带黑棕色，亚中褶一黑纵条伸达中带；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣背侧增厚并延伸




图 606 茂裳夜蛾 *Catocala doerriesi* Staudinger ♂ 外生殖器

出瓣端成一突，抱钩指形（图 606）。

分布 黑龙江、河南、湖北；俄罗斯。

鹿裳夜蛾 *Catocala proxeneta* Alpheraky (图版 XLVI-11)

Catocala proxeneta Alpheraky, 1895, Iris, 8: 197. (蒙古)

Catocala proxeneta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 125. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 311. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 346.




图 607 鹿裳夜蛾 *Catocala proxeneta* Alpheraky

♂ 外生殖器

翅展 37mm。头、胸灰白杂黑棕色；前翅褐灰色密布细黑点，基线、内线及外线黑色，内线波浪形外斜，肾纹中有红褐纹，前方一暗褐纹，后方一灰黄斑，外线中段二齿形，后半锯齿形，亚端线灰色，后半锯齿形；后翅黄色，中带与端带黑色，亚中褶一黑纵条伸达中带；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣端钝圆，腹缘中部凹，阳茎长，无角状器（图 607）。

分布 黑龙江；蒙古。

光裳夜蛾属 *Ephesia* Hübner

Ephesia Hübner, 1818, Zutr. Samml. exot. Schmett. 1: 11.

Type-species: *Phalaena paranymphe* Linnaeus.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额中部，额光滑无突起，有毛簇，复眼大；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，中胸有成对小毛簇；前足胫节无刺，中、后足胫节具刺，雄蛾中足胫节常有一褶沟着生长毛；腹部背面有脊状毛，基节有毛簇；前翅外缘微锯齿形，后翅中室约为翅长之 $1/3$ 。