

裳夜蛾丽江亚种 *Catocala nupta likiangensis* Mell

*Catocala nupta* ssp. *likiangensis* Mell, 1936, Dt. ent. Z. Iris, 50: 69. (云南丽江)

与指名亚种主要区别在于前翅色暗，斑纹及横线均不清晰，雌蛾尤其模糊，内线与中线之间及亚端线内侧不现浅色带。

分布 云南丽江。

柳裳夜蛾 *Catocala electa* (Vieweg) (图版 XLV-2)

*Catocala electa* Vieweg, 1790, Tab. Verz. 2: 33. (德国)

*Catocala zalmunna* Butler, 1877, Cist. Ent. 2: 241.

*Catocala electa* Borkhausen; Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 75. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 307. ——Mell, 1936, Dt ent. Z. Iris, 50: 72. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 345.




图 601 柳裳夜蛾 *Catocala electa* (Vieweg) ♂ 外生殖器

翅展 67—71mm。头、胸及前翅褐灰色，额、颈板、翅基片有黑纹，前翅亚中褶基部一黑纹，基、内线黑色，后者锯齿形，肾纹内缘黑色，外缘锯齿形，中有褐环，前方一黑褐纹，外线黑色锯齿形，在 2 脉处内突至肾纹后，亚端线灰白色锯齿形，端线由黑色衬白的点组成；后翅红色，中带黑色弯曲，端带黑色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣背缘近中部拱起，右瓣端尖，左瓣背端一指形突（图 601）。

寄主 柳、杨。

分布 黑龙江、新疆、山东、河南、湖北；日本，朝鲜，欧洲。