

端部及第三节杂黑褐色，颈板近基部有一黑横线，中部与端部有黑横纹，下胸与足灰白色，胫节杂黑褐色，跗节各节有一黑条纹；前翅灰色带褐色，布有黑褐细点，基线黑色，仅中室前可见，内线双线黑色，内一线弱，波曲外斜，环纹不显，肾纹灰色，中央褐色，黑褐边，外缘外突成几个齿，前方色暗褐，后方有一黑边微白斑，外线黑色，外侧衬灰白色，自前缘脉后外伸并外斜，6脉后呈锯齿形内斜，至3脉后内突与肾纹后的白斑连接，亚端线不明显，灰色衬褐色，6脉后微锯齿形，顶角有一黑灰色内斜纹，近翅外缘有一列黑点，端线黑色；后翅红色，中区有一黑带，在3脉处折曲，后端达1脉，端区有一黑带，前宽后窄，内缘在2脉处内突，其后凹缩，外缘前段不达顶角，中段波浪形，缘毛在2—6脉间黑、白相间，其余白色；腹部浅灰色。

分布 甘肃、新疆；中亚地区。

迪裳夜蛾 *Catocala elocata* (Esper) (图版 XLV-6)

Noctua elocata Esper, 1787, Schmett. Noct. 20, pl. 99, figs. 1, 2. (Ussenheim)

Catocala elocata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal.

Br. Mus. 12: 94. —Mell, 1936, Dt. ent. Z.

Iris, 50: 72. —Forster et Wohlfahrt, 1971,

Schmett. Mitteleur. p. 282. —Chen, 1985,

Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 130.

翅展 76mm。头、胸黑褐杂灰白色；前翅灰白杂褐色，基、内线均双线黑色波浪形，肾纹不清晰，外缘锯齿形，中线模糊黑色带状，中室下角后一灰白色斑，外线双线黑色锯齿形，外侧一暗影，亚端线黑色，后半锯齿形；后翅污红色，有黑色中带及端带，后者宽，顶角一白斑；腹部褐色。雄蛾抱器瓣端稍窄，背侧较厚或稍突，抱钩短（图 602）。

寄主 杨、柳。

分布 新疆、西藏；亚洲西部，欧洲。




图 602 迪裳夜蛾 *Catocala elocata* (Esper) ♂ 外生殖器

楼裳夜蛾 *Catocala remissa* Staudinger (图版 XLV-7)

Catocala remissa Staudinger, 1891, Iris, 4: 328, pl. 4, fig. 10. (Ashabad)

Catocala remissa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 120. —Warren, 1913, in

Seitz, Macrolep. World 3: 308, pl. 55f. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 346.

翅展 62—69mm。头、胸浅灰褐杂黑色，额有黑斑；前翅浅灰褐色，密布黑褐细点，亚中褶基部一黑纵线，基线黑色波浪形，内线双线黑色波浪形外斜，肾纹褐色，其