

椴裳夜蛾 *Catocala lara* Bremer (图版 XLIV-24)

Catocala lara Bremer, 1861, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Ptrsb. 3: 493. (Bureja 山脉)

Catocala lara: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 122. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 304, —Mell, 1936, Dt. ent. Z. Iris, 50: 66. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 346.




图 599 椴裳夜蛾 *Catocala lara* Bremer ♂ 外生殖器

翅展 68mm。头、胸灰色杂黑褐色；前翅灰褐色，基线、内线及外线黑色，前者只达中室，内线前半外侧一白斜斑，肾纹黑褐色灰白边，外线黑色，在 4—6 脉间为外突齿，内侧 4—8 脉间有一白色大斑，亚端线白色锯齿形，端线由黑白相衬的点组成；后翅黑棕色，外线为黄白色宽带，顶角黄白色，外缘毛黑白相间；腹部灰褐色。雄蛾抱钩短钝，阳茎细长（图 599）。

寄主 紫椴、糠椴。

分布 黑龙江、辽宁、河北；日本，朝鲜。

裳夜蛾指名亚种 *Catocala nupta nupta* (Linnaeus) (图版 XLV-1)

Phalaena Noctua nupta Linnaeus, 1767, Syst. nat. p. 841. (德国)

Catocala nupta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 84. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 304, pl. 55a. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 455. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 212. Mell, 1936, Dt. ent. Z. Iris. 50: 67, text fig. 8. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 156. —Chu *et al.*, 1963, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 1: 104. —Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 282. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 345. —Bretherton *et*