

帷裳夜蛾 *Catocala tapestrina* Moore (图版 XLVI-2)

Catocala tapestrina Moore, 1882, Lep. Atk. p. 166, pl. 5, fig. 13. (大吉岭)

Catocala tapestrina: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 136. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 455, pl. 56a.

翅展 76mm。头、胸褐色杂少许白色；前翅褐色杂紫灰色，部分带黑褐色，翅脉及亚中褶有灰纹，基线与内线黑色波浪形，内线前段外侧一灰白斜纹，肾纹黑色，其外缘绿灰色锯齿形，后方一黑边灰白斑，中有褐纹，外线黑色，后半锯齿形，亚端线紫灰色，前段内侧一黑斑，外侧一列黑纹，端线黑色，内侧一列黑点；后翅黄色，中带黑色折曲，端带宽，黑色波曲；腹部黑灰带褐色。雄蛾抱钩短刺形 (图 603)。

分布 云南；锡金，印度。




图 603 帷裳夜蛾 *Catocala tapestrina*
Moore ♂ 外生殖器

亚裳夜蛾 *Catocala armandi* Poujade (图版 XLVI-6)

Catocala armandi Poujade, 1888, Bull. Soc. Ent. Fr. 6: ccviii. (中国 Moupin)

Catocala davidi Poujade, 1887, Bull. Soc. Ent. Fr. 7: 38. (preoccupied)

Catocala armandi: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 131.

翅展 70mm。头、胸及前翅褐色杂灰色，前翅带黑色，布有灰色细点，基线黑色波浪形达 1 脉，内线双线黑色，线间微白，波曲外斜，内线内方色较黑，肾纹黑色，外围白色及黑色，后方一褐斑，中有黑圈，外围白色，外线黑色锯齿形，前端内侧一白纹，亚端线灰白色锯齿形，外侧衬黑色，翅外缘一列衬白的黑点；后翅赭黄色，中带黑色波曲，后端达亚中褶，与后缘区黑带相合，端带黑色，前端宽，但不达顶角，缘毛褐白相间；腹部褐色。

分布 四川。

鸮裳夜蛾 *Catocala pataloides* Mell (图版 XLVI-7)

Catocala pataloides Mell, 1931, Mitt. D. ent. Ges. 2: 89, pl. 2, fig. 1, text fig. 1. (广东)

Catocala pataloides: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 131.

翅展 68mm。头、胸暗褐杂灰色，头顶与额有黄白斑，颈板有黄白线；前翅暗褐，有黄绿细点，前缘一列黄纹，基线，内线及外线均双线黑褐色，基、内线波浪形，无