




图 330 东弓夜蛾 *Cerastis orientalis* Boursis ♂ 外生殖器

弓夜蛾 *Cerastis rubricosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 XVI-36)

Noctua rubricosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 77. (奥地利)

Noctua rufa Haworth, 1809, Lep. Brit. p. 232.

Noctua mista Hubner, [1813], Eur. Schmett., Noct. fig. 509.

Cerastis rubricosa: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 60, pl. 14b. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 700. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.197.

翅展 30mm。头、胸及前翅褐色带紫灰，基线、内线及中线黑色波浪形，外线黑色锯齿形，亚端线褐色，环、肾纹灰色黑边；后翅黄褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣端腹缘稍凹，抱钩斜向背伸，阳茎有粗大棘形角状器（图 331）。




图 331 弓夜蛾 *Cerastis rubricosa* (Denis et Schiffermüller) ♂ 外生殖器

寄主 酸模、车前、蒲公英等属。
分布 新疆；日本，中亚地区，欧洲。

贯夜蛾属 *Mesogona* Boisduval

Mesogona Boisduval, 1840, Ind. Meth, p. 144.

Type-species: *Noctua acetosellae* (Denis et Schiffermüller)

喙发达，下唇须斜向上伸，额光滑，雄蛾触角线形，胸部只被毛，前足胫节无刺，中、后足胫节具刺。雄蛾外生殖器的抱器瓣较长，中段稍窄，瓣端有一列刺，瓣背端较尖，阳茎较粗长。

明贯夜蛾 *Mesogona oxalina* (Hübner) (图版 XVI-37)

Noctua oxalina Hübner, 1803, Eur. Schmett. Noct. pl. 45, fig. 219. (欧洲)

Mythimna oxalina: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 609.

Mesogona oxalina: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 62. —Chen. 1986, Cutworms agric. reg. China p.200.

翅展 38mm。头、胸及前翅红褐色，后者带有紫色及灰色，基线、内线及外线灰白色，亚端线黑色，环、肾纹暗褐色灰黄边，前者较大；后翅黄白，大部带红褐色，外线、亚端线褐色；腹部黄褐色。雄蛾抱钩长，伸向背伸，阳茎粗长，有一长棘形及一针形角状器（图 332）。




图 332 明贯夜蛾 *Mesogona oxalina* (Hübner) ♂ 外生殖器

分布 甘肃、新疆；欧洲，美洲北部。