

基部几节有毛簇，前翅有一副室，后翅5脉微弱，自中室横脉中下部发出。

雄蛾抱器瓣简单，无突起物，端部钝圆。

维夜蛾 *Chalconyx ypsilon* (Butler) (图版XXXI-40)

Gerbatha ypsilon Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 24, pl. 47, fig. 1. (日本)

Gerbathodes ypsilon: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 175. ——Chen, 1982, Icon, Het. Sin. 3: 260

Chalconyx ypsilon: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 780.

翅展31—40mm。头部褐黄；胸部灰色，有黑褐细点；前翅灰色，布有黑褐细点，外线外方有褐色光泽，基线黑色，仅前端及中室处可见，内、中、外线均黑色，前者细弱，波浪形，中线带状，后端与外线相交合成Y形，外线锯齿形，后半内弯，无剑纹与环纹，肾纹白色，中凹，亚端线黑色，外侧衬灰白色，锯齿形；后翅污褐色；腹部暗灰带褐色。

分布 河北、陕西、浙江；日本。

雍夜蛾属 *Oederemia* Hampson

Oederemia Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 405.

Type-species: *Oederemia lithoplasta* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达额中部，第三节短，额突起成球面形，其下有角质片，复眼大，雄蛾触角线形；胸部毛、鳞混杂，前、后胸有散开的毛簇；腹部基部几节背面有毛簇，前翅有副室。

种 检 索 表

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. 前翅大部黑色 | 白点雍夜蛾 <i>Oederemia esox</i> |
| 前翅不带黑色 | 2 |
| 2. 前翅亚中褶有黑纹 | 小雍夜蛾 <i>O. nannata</i> |
| 前翅亚中褶无黑纹 | 雍夜蛾 <i>O. lithoplasta</i> |

白点雍夜蛾 *Oederemia esox* Draudt (图版XXXII-1)

Oederemia esox Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 18, pl. 3, fig. 11. (太白山，天目山，莫干山，衡山，龙潭，丽江)

Oederemia esox: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 22.

翅展32mm。头、胸黑灰杂白色；前翅浅灰色，密布细黑点，基线前段白色，内线由不整齐白点列成，环纹较大，同翅色，有不完整的黑边，肾纹白色杂黑褐色，中央一