

翅展 23 mm。头部与胸部暗灰褐色杂少许褐白色；前翅暗灰褐色，内线深褐色，波曲外斜，外侧衬灰色，极模糊，肾纹“8”字形，外围灰白色，下半部赭黄色，外线黑褐色，锯齿形外弯，在中褶处内凹，4脉后内弯，亚端线隐约可见，深褐色，外侧衬灰色，不规则波曲，在中褶与亚中褶处稍内弯，近翅外缘有一列深褐点；后翅褐色；腹部灰褐色。

分布 海南；印度尼西亚。

纒夜蛾属 *Chamyrisilla* Draudt

Chamyrisilla Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 138.

Type-species: *Chamyrisilla ampolleta* Draudt.

喙发达，下唇须向上伸，额无突起，触角线形，复眼大；胸部主要被鳞片，鳞片宽大，前、后胸有毛簇；腹部有一列毛簇，第四、五节的毛簇最大；前翅有一副室；后翅5脉发达。

纒夜蛾 *Chamyrisilla ampolleta* Draudt (图版XLI-24)

Chamyrisilla ampolleta Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 138, pl. 8, fig. 29. (衡山)

Chamyrisilla ampolleta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

翅展 20 mm。头部与胸部暗褐色；前翅暗褐色，内线较粗，黑色，环纹只现一细白点，肾纹白色，大而明显，外缘中部凹，前半部中央有一黑点，肾纹前方有一白斑，外线较粗，黑色，锯齿形，亚端线白色，不规则弯曲，内侧色较黑，端线由一列黑点组成，均衬以白色，缘毛基部白色；后翅暗褐色，隐约可见横脉纹；腹部暗褐色。

分布 浙江、湖南、江西。

璫夜蛾属 *Maliattha* Walker

Maliattha Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 86.

Type-species: *Maliattha separata* Walker.

Hyelopsis Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 304.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，前缘被鳞，额平滑，复眼大而圆，雄蛾触角有纤毛；胸部主要是鳞片，前胸无毛簇，胫节微有毛；腹部基部几节上有毛簇，第三和第四节上的毛簇较大；前翅顶角稍钝，外缘斜。

幼虫无第一对腹足，第二对腹足也不发达。