

手头标本系饲养所得，故色偏暗。

饰皮夜蛾属 *Characoma* Walker

Characoma Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 106.

Type-species: *Characoma albulalis* Walker.

Corticata Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 52.

Paraxia Moschler, 1890, Abh. senckenb. Nat. Ges. 16: 120.

Hypothripa Hampson, 1894, En. Br. Ind. 2: 383.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，额平滑无突起，复眼圆大，雄蛾触角线形，胸部主要被鳞，后胸有散开的大毛簇，腹部基部几节背面有毛簇，前翅短宽，有副室，后翅3、4脉共柄。

暗影饰皮夜蛾 *Characoma ruficirra* (Hampson) (图版 XLIII-31)

Hypothripa ruficirra Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 540. (日本)

Characoma ruficirra: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 236, text fig. 80. —

Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 386. —Holloway, 1976, Moths Borneo. p.

21, fig. 134. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 795. —Chen, 1985, Econ. Ins.

Fn. China, Lep. Noct. 4: 126.




图 589 暗影饰皮夜蛾 *Characoma ruficirra* (Hampson)

♂ 外生殖器

翅展 21mm 左右。头部与胸部灰色杂褐色；前翅灰色，内线内方带暗褐色，内线不清晰，双线黑色，由竖鳞组成，中线稍近内线，不明显，黑暗色波浪形，肾纹只现一黑点，外线黑褐色，细锯齿形，外弯至 4 脉折向内弯，前段外方有一黑褐斜纹，亚端线黑

褐色，不规则波浪形，端线由一系列黑点组成，缘毛褐色，后翅淡褐灰色，翅脉和端区色较暗。雄蛾钩形突长，端部尖，近端部两侧各一突，抱器瓣简单，抱器腹突粗（图 589）。

寄主 栎。

分布 山东、江西；日本，锡金，印度。

侏皮夜蛾属 *Nanaguna* Walker

Nanaguna Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 85.

Type-species: *Nanaguna breviscula* Walker.

Bagistana Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 194.

Dumatha Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 105.

Clettharra Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 101.

Tamusida Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1732.

Thrypticodes Lucas, 1890, Proc. Linn. Soc. N. S. W. 4: 1073.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额中部，第三节长，端部稍膨大，额平滑无突起，在两触角间有毛簇，复眼圆大，雄蛾触角线形，稍扁，胸部主要被鳞，颈端向尖微成脊状，后胸有散开的毛簇，前、中足胫节有毛，后足胫节被鳞，腹部基节背面有毛簇，前翅 7、8、9、10 脉共柄，无副室，后翅 3、4 脉共柄。

侏皮夜蛾 *Nanaguna breviscula* Walker (图版 XLIII-32)

Nanaguna breviscula Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 85. (沙撈越)

Nanaguna breviscula: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 252. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 388. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 127.

翅展 22—26mm。头、胸白色杂浅褐色；前翅浅黄色微带赭色，翅后缘一粗黑纹，至外区膨大近达 2 脉，前缘区中部一暗褐外斜宽条，后端与褐色肾纹相连，基线黑色，外线白色，内侧在 2—6 脉上有黑点，近顶角的翅外缘有二黑点，亚端线白色锯齿形，端区 4—7 脉间有模糊褐云；后翅白色，端区带褐色；腹部黄白色。雄蛾中室有暗褐毛束，前缘区有紫棕色毛束。

分布 海南、云南、西藏；锡金，印度，斯里兰卡，东南亚地区，大洋洲。

皮夜蛾属 *Nycteola* Hübner

Nycteola Hübner, 1822, Syst. alph. Verz. p. 60, 66.