

Clinophlebia sericea Hampson, 1893, Het. Colln Br. Mus. 9: 92.

Chasmina candida: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 352. —Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 187.

Arbasera candida: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 276.

翅展 40—50 mm。全体白色，有丝样光泽，下唇须上缘及端部褐黄，额下部微黄，上半部为褐条，前足腿节上缘，胫节及跗节外缘均桔黄色，胫节有二黑斑，第一跗节有一黑斑；前翅翅型肥大，雄蛾前翅前缘 2/3 略翘。雄蛾抱器瓣长而宽，向端渐尖，无附件（图 558）。

分布 台湾、广东、海南、云南；缅甸，柬埔寨等。




图 558 曲缘哲夜蛾 *Chasmina candida* (Walker) ♂ 外生殖器




图 559 胡哲夜蛾 *Chasmina fasciculosa* (Walker) ♂ 外生殖器

胡哲夜蛾 *Chasmina fasciculosa* (Walker) (图版 XXXVII-25)

Acontia fasciculosa Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1760. (斯里兰卡)

Clinophlebia dasyptera Chen, 1982, Sinozool. 2: 43.

Calesia fasciculosa: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 581.

翅展 35 mm。头部与胸部白色，下唇须第二、三节外侧带有褐色，足外侧有褐斑；前翅白色，外区有一黄褐色宽带，雄蛾此带前端有密毛簇，呈褐灰色，此处翅前缘稍拱曲；后翅白色；腹部白色，后几节背面微带黄色。雄蛾抱器瓣基部平，端尖，抱钩粗，斜向背伸（图 559）。

分布 福建、海南；斯里兰卡。

细须哲夜蛾 *Chasmina gracilipalpis* Warren (图版 XXXVII-26)

Chasmina gracilipalpis Warren, 1912, Nov. zool. 19: 36. (大吉岭)

Chasmina gracilipalpis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 194. —Chen, 1982,