

Icon. Het. Sin. 3: 277.

翅展 29 mm。头部白色，额上缘有一褐色横条，下唇须端部褐色；胸部背面白色，前足与中足腿节上缘有黑条，胫节有二黑斑，第一、二跗节各有一黑斑，后足胫节有一黑斑，第一、二跗节各有一黑斑；前翅白色，布有零星黑色细点，前缘脉基部及中部各有二黑点，亚端线为一淡黄色带，其前端为一弯曲黑斑，线内侧各翅脉及翅后缘各有一黑点，端线只现一列黑点；后翅白色，翅外缘在 3—7 脉端部各有一黑点；腹部白色。

分布 福建、云南；锡金。

判哲夜蛾 *Chasmina judicata* (Walker) (图版 XXXVII—27)

Acontia judicata Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1760. (印度)

Leocyma judicata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 289.

Chasmina judicata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 354. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 194. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 276.

翅展 26—30 mm。全体白色，前足胫节有二黑斑，第一、二跗节各有一黑斑，中、后足胫节端部及第一、二跗节各有一黑斑；前翅基线与内线均只在前缘脉现一黑点，中线前端为一黑点，其后为一段黄色细线，外线为完整的黄褐色细线，在前缘脉上为一黑点，端线褐色，内侧有一列长黑点，缘毛端部微褐；后翅外缘在顶角处有一列黑点，内侧有一列黑点。

分布 广东；印度，斯里兰卡。

明夜蛾属 *Sphragifera* Staudinger

Sphragifera Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 554.

Type-species: *Anthoecia sigillata* Ménétriers.

Sphragidifera Bryk, 1949, Ark. zool. 41 (1) 1: 108.

喙发达；下唇鬚向上伸，第二节达头顶，第三节短；额平滑，复眼圆大，雄蛾触角大部丝状；胸部几全为鳞片，无毛簇，胫节略有毛；腹部只基节上有毛簇；前翅顶角钝，外缘曲度平稳，不成锯齿形。

种 检 索 表

1. 前翅白色 2
前后翅褐色 斑明夜蛾 *Sphragifera maculata*
2. 前翅亚顶斑波曲形 迴明夜蛾 *S. rejecta*
前翅亚顶斑非波曲形 3
3. 前翅亚顶斑大，近圆形 4