

**分布** 黑龙江、河北、山西、陕西、江苏、浙江、湖南；日本，朝鲜。

**黑白夜蛾 *Chasminodes atrata* (Butler) (图版 XXXVII-20)**

*Chasmina atrata* Butler, 1884, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 274. (日本)

*Chasminodes atrata*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 350. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 778. ——Kononenko, 1982, Rev. ent. URSS 41 (3): 588—90. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 276.

翅展 23 mm 左右。头部、胸部及腹部白色，下唇须前缘及端部微黑，前足胫节内侧带褐色；前翅基部白色，其余紫褐色有金属光泽，白色区与紫褐色区的界限不清晰，略呈外弯的弧形；后翅色与前翅相似，但界限更模糊，缘毛端部微白。雄蛾抱器瓣背缘近中部隆起成丘形，抱钩短小（图 556）。

**分布** 黑龙江；日本。

**黑痣白夜蛾 *Chasminodes nigrostigma* Yang (图版 XXXVII-21)**

*Chasminodes nigrostigma* Yang, 1964, Acta. ent. Sin. 13: 457, figs. 3, 6. (四川峨眉山)

*Chasminodes nigrostigma*: Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 38.

翅展 35 mm。头部白色，触角褐色，基部白色；胸部白色，中足胫节基部有一小黑斑；前翅白色，中室下角有一黑斑，翅外缘有一列小黑点；后翅白色；腹部白色。

**分布** 四川。

**雪白夜蛾 *Chasminodes niveus* Yang (图版 XXXVII-22)**

*Chasminodes niveus* Yang, 1964, Acta ent. Sin. 13: 456, figs. 2, 3. (四川峨眉山)

翅展 30 mm。头部白色，触角黄褐色；胸部及前翅白色，前缘基部黑褐色，近顶角有黑褐鳞；后翅白色无斑纹；腹部白色。

**分布** 四川。

**黑带白夜蛾 *Chasminodes nigrifascia* Chen (图版 XXXVII-23)**

*Chasminodes nigrifascla* Chen, 1986, Acta ent. Sin. 29 (2): 212—3, fig. 3. (神农架)

翅展 26—30 mm。头部与胸部白色，下唇须第三节黑色，足白色，前足胫节内侧黑色，前足跗节有黑斑，中、后足跗节微带黑灰色；前翅白色，无斑纹；后翅白色，端区有一灰黑色带，前宽后窄，至 2 脉后不显；前翅反面灰黑色，基部、前缘区、端区、1 脉及后缘区杂白色，中室端部有一明显三角形白点。

雄性外生殖器的钩形突粗，端部尖，抱器瓣窄长，背缘近端部有一粗棘状突起，阳茎内囊有细针毛状角状器（图 557）。