

及肾纹深褐色，后者后端稍内突，后翅暗褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱钩粗而弯，抱器腹的腹端另成一突，阳茎有成列棘形角状器（图 148）。

分布 新疆、西藏；中亚地区，欧洲。

侏卡夜蛾 *Chersotis ocellina* (Denis et Schiffermüller) (图版 XI-7)

Noctua ocellina (Denis et Schiffermüller), 1775, Schmett. Wien. p. 313. (奥地利)

Rhyacia ocellina: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 54. ——Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 73, 250.

Chersotis ocellina: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 288, pl. 87, fig. 2054.

翅展 27mm。头、胸黄褐色；前翅暗褐色，内、外线间及端区带黑色，内线内方各翅脉褐黄色，基线、内线及外线黑色，基线外侧及内线内侧衬灰白或灰色，亚中褶基部有一黑纹，剑纹外围灰白色及黑色，环、肾纹浅黄色，后者后端内突，内线外方的中室黑色，肾纹外侧有深褐纹，亚端线浅灰色，内侧一列黑齿纹；后翅与腹部暗褐色。

分布 青海、新疆；欧洲。

漫卡夜蛾 *Chersotis ononensis* (Bremer) (图版 XI-8)

Agrotis ononensis Bremer, 1861, Lep. ost-sib. p. 486. (Onon)

Agrotis scaramangae Alpheraky, 1882, Hor. Soc. ent. ross. 17: 47.

Hermonassa ononensis: Kovacs et Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 329.

Chersotis ononensis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 288, pl. 87, fig. 2053.

翅展 30mm。头、胸灰褐色；前翅灰带褐，有淡紫色调，翅脉黑棕色，前、后衬白色，脉间有褐色纵纹，中室黑棕色，翅基部有黑点，亚中褶基部有一黑纵纹，环纹与肾纹白色黑边，肾纹外有一黑棕色齿形纹，端区各翅脉间有楔形黑棕色纵纹，缘毛微黄，中有一褐线；后翅淡褐色，缘毛微黄；腹部暗褐灰色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、青海、甘肃；蒙古。

狭翅夜蛾属 *Hermonassa* Walker

Hermonassa Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 631.

Type-species: *Hermonassa consignata* Walker.

喙发达，雄蛾触角线形，各足胫节均具刺，前翅狭窄，环纹与肾纹多明显暗色，雄蛾外生殖器的钩形突较粗，指状或抹刀状，抱器瓣较长，某些种有抱器腹突或抱器腹端突，阳茎内囊常有一发达的角状器。本属种类多分布于我国西南，少数分布于东北，国外主要分布于印度，锡金，尼泊尔。