

云陞夜蛾，新种 *Chilodes yunnana* Chen sp. nov. (图版XXXIV-32)

翅展 33 mm。头部黑褐色，触角基节外侧黄褐色，额光滑无突起物；胸部背面褐色，颈板近基部与中部各有一褐黑色横条，前胸毛簇褐黑色杂有灰白色，翅基片基部褐黑色，端部黄褐色，足外侧黑褐色，跗节各节间有赭黄斑；前翅褐黄色，前缘区，中室后及端区大部带暗褐色，中脉之前的各翅脉浅赭黄色，前后均衬以黑褐色纵纹，基线黑褐色，仅前缘区可见，内线黑色，深锯齿形，在亚中褶后强内斜至 1 脉，亚中褶有一不清晰黑褐纵纹，中室有一黑色叉形纵纹，外端伸近肾纹，肾纹黑色，浅赭黄边，后端内侧沿中脉内突，其前缘衬一黑色楔形纵纹，外线黑色锯齿形，有间断，齿尖在各翅脉上成一黑点，至 5 脉后明显内斜，亚端线不清晰，由 3 脉前各翅脉间的楔形黑纹组成，自顶角内斜，翅外缘有一列新月形黑点，缘毛中部有一黑褐线，端部黑褐色；后翅浅褐色，翅脉暗褐色，端线黑褐色，微波浪形，缘毛浅赭黄色，中有一黑褐线；腹部褐色。

正模 ♀，云南永胜六德，1984. VII. 7，陈一心采。

本种近似 *Chilodes dubiosa* Draudt，主要区别为本种前翅中室有黑色叉形纵纹，5 脉前各翅脉两侧均衬黑褐色，肾纹窄，有浅赭黄边；本种亦似 *Nonagria grisescens* Hampson，但额无横向角质片。

介夜蛾属 *Amphidrina* Staudinger

Amphidrina Staudinger, 1891, Iris 4: 293.

Type-species: *Amphidrina agrotina* Staudinger.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，向前伸，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形，少数双栉形；胸部主要被鳞片，前、后胸有散开型毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉弱。

曲肾介夜蛾 *Amphidrina amurensis* (Staudinger) (图版XXXIV-33)

Dryobota amurensis Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 432, pl. 7. fig. 5. (Ussuri)

Amphidrina amurensis: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 296. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 205. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 249

翅展 38 mm。头、胸及前翅褐灰色，前翅微带紫色，基线、内线黑色锯齿形，环纹黑边，后端与黑边的剑纹相遇，中线黑灰色，肾纹黑边，后端膨大并内伸，外线双线黑色锯齿形，亚端线浅褐色，在 7 脉上有黑纵纹，外侧一列黑尖纹；后翅褐色；腹部浅褐色。雄蛾抱器腹延伸成一巨尖突，抱钩短棘形 (图 520)。

分布 黑龙江、内蒙古；蒙古，俄罗斯。