

片端部微白，翅基片大部黄白色，内缘及后端褐黑色；前翅褐色，前缘区基部及后缘区大半部色较暗，基线较粗而不清晰，黑色，内线黑色，不清晰，自前缘脉外斜至中室后折向内斜，亚中褶有一黑色宽纵条，自内线伸达外线，其外端有一白色圆点，环纹圆形，黑边，肾纹有不清晰的黑边，前方有一黑色近方形斑，外线黑色，自前缘脉外弯至5脉后内斜，亚端线不明显，在7脉处外凸，在5脉后可见一系列不整齐的黑纹，外区前缘脉上有一列微白点，端线黑色，亚中褶端部有不明晰的白纹；后翅褐色，基部色浅，横脉纹黑褐色；腹部褐色。

分布 江苏、浙江、湖北、湖南、福建。

黑斑流夜蛾 *Chytonix albonotata* (Staudinger) (图版XXXIII-35)

Bryophila albonotata Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 396, pl. 5, fig. 9. (乌苏里地区)

Chytonix nigribasalis Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 611.

Chytonix albonotata: Hampson, 1908, ibid. p. 610. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Meths Jap. 1: 779.

翅展 30—40 mm。头、胸白色带褐色；前翅灰白带褐色，内线及外线内方的后缘区黑褐色，基线黑色锯齿形，不明显，内线黑色，不规则锯齿形。环纹大，斜椭圆形，中线仅前半可见黑色斜斑状，肾纹大，内外缘凹，中有黑纹，外线双线黑色，中段锯齿形，在亚中褶后有一黑纵纹，外端一白点，亚端线灰白色锯齿形。中段内侧有黑褐斑，外线中部一黑线伸至翅外缘；后翅与腹部褐灰色。

分布 黑龙江、四川、云南；日本。

手头标本为一变异个体。

伴流夜蛾 *Chytonix erastroides* Draudt (图版XXXIII-36)

Chytonix erastroides Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 112, pl. 7, fig. 21. (莫干山、天目山)

翅展 30 mm。头、胸及前翅黑褐杂浅褐黄色，前翅基线黑色，内线微黑，不明显，环纹斜，浅褐黄色，肾纹污褐色，内、外缘中凹，两纹间为斗形黑斑，中线黑色，前端粗点状，后半锯齿形，似窄带，外线浅褐黄衬黑色，后半锯齿形，亚端浅褐黄色锯齿形，翅外缘一列黑点；后翅暗灰色；腹部暗褐色。

分布 浙江、江西。

清流夜蛾 *Chytonix latipennis* Draudt (图版XXXIII-37)

Chytonix latipennis Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 112, pl. 7, fig. 19. (衡山、天目山等)

Chytonix latipennis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 35.