

喙发达，下唇须向上伸，雄蛾下唇须极长，远超过头顶，达胸中部，第三节前缘有毛簇，复眼圆大，额平滑，雄蛾触角有纤毛丛和较长鬃毛；胸部毛鳞混生；前翅有副室。

种 检 索 表

1. 前翅外线外方黑色 7
- 前翅外线外方非黑色 2
2. 前翅内线、外线白色 双带胸须夜蛾 *Cidariplura brevivittalis*
- 前翅内线、外线非白色 3
3. 肾纹黄或黄白色 4
- 肾纹色暗 5
4. 前翅亚端区有白点列 赭纹胸须夜蛾 *C. ochreistigma*
- 前翅亚端区无白点列 胸须夜蛾 *C. gladiata*
5. 前翅外线直 巴胸须夜蛾 *C. butleri*
- 前翅外线波曲 6
6. 抱器瓣端钝，无突起 华胸须夜蛾 *C. chinensis*
- 抱器瓣端分叉 徽胸须夜蛾 *C. signata*
7. 前翅外线与亚端线间黑色 8
- 前翅外线与亚端线间非黑色 韩胸须夜蛾 *C. hani*
8. 前翅内半黄褐色 褐胸须夜蛾 *C. brontesalis*
- 前翅内半黑褐色 黄带胸须夜蛾 *C. duplicifascia*

双带胸须夜蛾 *Cidariplura brevivittalis* (Moore) (图版 LXVII-18)

Bertula brevivittalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 87. (Bengal)

Mastigophora brevivittalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 49. —Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 254. —Prout, 1928, Sarawak Mus. J. 3: 471.

Cidariplura brevivittalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415. —Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 919. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 363.

翅展 25 mm。头部黑色，下唇须向上伸，远超过头顶，第二节外侧褐黑色，第三节浅黄色杂少许黑褐色，前缘饰长毛；胸部烟黑色，背面杂有少许赭黄色，前足胫节外侧黑色，跗节浅赭黄色；前翅褐黑色，基部有模糊黑斑，内线粗，淡黄色，较直外斜，环纹大，黑色，较模糊，外围淡黄色，肾纹短肥，近圆形，淡黄边，外线粗，淡黄色，近呈直线内斜，内侧有一列不整齐的黑点，亚端线淡黄色，后半内侧有一列小黑斑，肾纹外一浅黄条伸至翅外缘，端线为一列黑点；后翅烟褐色带黑褐，外线、亚端线浅黄色，不明显，后者后半锯齿形；腹部黑褐色。雄蛾抱器腹延伸为一棘形突，瓣端分叉，腹一




图 684 双带胸须夜蛾 *Cidariplura brevivittalis*
(Moore) ♂ 外生殖器

支宽，其端缘锯齿形阳茎粗长，无角状器（图 684）。

分布 广西、西藏；日本，印度，孟加拉国。

赭纹胸须夜蛾 *Cidariplura ochreistigma* (Leech)

Mastigophorus ochreistigma Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 629. (宜昌、九江、长阳)

Cidariplura ochreistigma: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415.

翅展 37 mm。头部与胸部褐色；前翅褐色，内线黑色，微波曲，稍外斜，肾纹浅黄色，窄曲，中线不显，外线黑色，外侧衬黄白色，自前缘脉后外斜，至 6 脉处折角内斜，亚端线由一系列浅黄点组成，翅外缘有一列黑点；后翅褐色，外线黑色，外侧衬黄白色，在中褶处微折曲，其后近直线内斜，亚端线由一系列浅黄点组成，端线黑色；腹部褐色。

分布 湖北、江西。

胸须夜蛾 *Cidariplura gladiata* Butler (图版 LXVII-19)

Cidariplura gladiata Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 449. (日本横浜)

Mastigophorus gladiata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 629.

Cidariplura gladiata: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 564. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415, pl. 71k. —Strand, 1919, Archiv Naturg. 82A (1): 149. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 191. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 141. —Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 918. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

翅展 28—32 mm。头部棕灰色，下唇须向上伸并向后弯达后胸背面，第三节扁似