



图 685 胸须夜蛾 *Cidariplura gladiata* Butler ♂ 外生殖器

浆，端部尖；胸部背面棕灰色，足外侧暗褐色，跗节浅赭黄色；前翅淡棕色，内线棕色，微有波曲，自前缘脉外斜，线内侧衬浅赭黄色，环纹只现一白点，肾纹小，卵形，白色，外线棕色，外侧衬黄白色，7脉后内斜，亚端线仅后半隐约可见波浪形，端线棕色；后翅浅棕色，外线棕色，外侧衬白色，亚端线不明显；腹部灰色。雄蛾抱器腹延伸成一棘突，瓣端分叉，背一支棘形，腹一支舌形（图 685）。

分布 湖北、湖南、福建、四川；日本。

褐胸须夜蛾 *Cidariplura brontesalis* (Walker) (图版 LXVII-20)

Mastigophora brontesalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 151.
(Sarawak)

Mastigophora sumatrensis Walker, [1866] 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1166.

Mastigophora scopigeralis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 86.

Mastigophorus brontesalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 48, fig. 22.

Cidariplura brontesalis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

翅展 36 mm。头部黑褐色，下唇须第一节外侧黑灰色杂浅黄色及黑色，下缘有浅黄鳞及少许黑色，向前伸，上缘鳞片致密，第二节灰色杂黑褐色，折向后行，上缘饰赭色鳞，第三节赭色杂少许黑色，向后伸达腹背；胸部棕色，颈板褐色，基部黑褐色，足外侧黑色，前、中足胫节与跗节褐黑色杂少许灰色，胫距及跗节各节间有白斑，后足胫节与跗节灰色杂黑色，胫距及跗节各节间有白斑；前翅中线内方黄褐色，中线与外线之间黄色，外线外方棕褐色，内线双线暗褐色，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，环纹只现一黄点，中线较粗，褐色，直线内斜，肾纹黄色，边缘不清晰，前后部各有一黑点，位于横脉两端，外线双线棕褐色，自前缘脉后外斜，至 9 脉成一外凸齿，其后细波

浪形内斜，在5脉处稍外凸，3脉后较粗，外一线此处成一黑斑，亚端线黄色，锯齿形，在7脉及3、4脉处齿大，各翅尖在翅脉上为黑点，外线与亚端线间色暗；后翅污褐色，外线微黄，亚端线为一列衬黑的黄色点，翅外缘有一列褐黄点；腹部暗褐色。

分布 云南；印度，锡金，马来西亚，印度尼西亚。

黄带胸须夜蛾 *Cidariplura duplicifascia* (Hampson) (图版 LXVII-21)

Mastigophorus duplicifascia Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 48. (锡金)

Cidariplura duplicifascia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

翅展 33 mm。头部黑棕色杂少许黄色，雄蛾下唇须极长，第一节向前平伸，第二节越过头顶向后伸，第三节长，饰长毛簇；胸部背面黑棕色杂少许黄色，足褐黄色杂黑褐色；前翅黑棕色，内线黑色，内侧衬褐色，在亚中褶处折曲，环纹与肾纹黑色，外线为一浅赭黄色斜带，其中有一黑棕色线，稍偏外，亚端线赭黄色，自前缘脉外斜，在7脉成一外凸齿，2—5脉间外凸，后半波曲，翅外缘有一列三角形黑点；后翅暗褐色带灰色，端区色更深，外线浅赭黄色，较直，亚端线浅赭黄色，不明显，中段外弯，波浪形，翅外缘有一列三角形黑点；腹部暗褐色。

分布 云南；锡金。

巴胸须夜蛾 *Cidariplura butleri* (Leech) (图版 LXVII-22)

Mastigophorus butleri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 629. (中国西部: Chia-kou-ho, Wa-shan)

Cidariplura butleri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415, pl. 74g. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 150, pl. 15, fig. 296. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1035.

翅展 37 mm。头部褐色，雄蛾触角线形，有长纤毛，下唇须长，向上伸，远超过头顶，第一、二节外侧黑褐色，前缘饰密鳞，第三节黄色杂有少许黑褐色，前缘饰浅黄色长毛；胸部背面褐色，足外侧暗褐色；前翅褐色带紫灰色，内线黑褐色，稍外弯，但在中室稍内凹，内线内方区域暗褐色，肾纹窄曲，黑褐色，后端微钩，外线黑褐色，较粗，直线内斜，内侧衬褐黄色，亚端线黑褐色，不规则波曲，中段外弯；后翅褐色，横脉纹黑褐色，窄曲，外线与亚端线黑褐色，不明显；腹部褐色。

分布 湖南、福建、海南、四川。

华胸须夜蛾 *Cidariplura chinensis* Chen (图版 LXVII-23)

Cidariplura chinensis Chen, 1994, Acta ent. sin. 37 (2): 216, fig. 4 male genitalia. (湖南道县)

翅展 41 mm。头部与胸部暗褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须长，向上弯达胸