

浪形内斜，在5脉处稍外凸，3脉后较粗，外一线此处成一黑斑，亚端线黄色，锯齿形，在7脉及3、4脉处齿大，各翅尖在翅脉上为黑点，外线与亚端线间色暗；后翅污褐色，外线微黄，亚端线为一列衬黑的黄色点，翅外缘有一列褐黄点；腹部暗褐色。

分布 云南；印度，锡金，马来西亚，印度尼西亚。

黄带胸须夜蛾 *Cidariplura duplicifascia* (Hampson) (图版 LXVII-21)

Mastigophorus duplicifascia Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 48. (锡金)

Cidariplura duplicifascia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

翅展 33 mm。头部黑棕色杂少许黄色，雄蛾下唇须极长，第一节向前平伸，第二节越过头顶向后伸，第三节长，饰长毛簇；胸部背面黑棕色杂少许黄色，足褐黄色杂黑褐色；前翅黑棕色，内线黑色，内侧衬褐色，在亚中褶处折曲，环纹与肾纹黑色，外线为一浅赭黄色斜带，其中有一黑棕色线，稍偏外，亚端线赭黄色，自前缘脉外斜，在7脉成一外凸齿，2—5脉间外凸，后半波曲，翅外缘有一列三角形黑点；后翅暗褐色带灰色，端区色更深，外线浅赭黄色，较直，亚端线浅赭黄色，不明显，中段外弯，波浪形，翅外缘有一列三角形黑点；腹部暗褐色。

分布 云南；锡金。

巴胸须夜蛾 *Cidariplura butleri* (Leech) (图版 LXVII-22)

Mastigophorus butleri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 629. (中国西部: Chia-kou-ho, Wa-shan)

Cidaripluta butleri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415, pl. 74g. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 150, pl. 15, fig. 296. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1035.

翅展 37 mm。头部褐色，雄蛾触角线形，有长纤毛，下唇须长，向上伸，远超过头顶，第一、二节外侧黑褐色，前缘饰密鳞，第三节黄色杂有少许黑褐色，前缘饰浅黄色长毛；胸部背面褐色，足外侧暗褐色；前翅褐色带紫灰色，内线黑褐色，稍外弯，但在中室稍内凹，内线内方区域暗褐色，肾纹窄曲，黑褐色，后端微钩，外线黑褐色，较粗，直线内斜，内侧衬褐黄色，亚端线黑褐色，不规则波曲，中段外弯；后翅褐色，横脉纹黑褐色，窄曲，外线与亚端线黑褐色，不明显；腹部褐色。

分布 湖南、福建、海南、四川。

华胸须夜蛾 *Cidariplura chinensis* Chen (图版 LXVII-23)

Cidariplura chinensis Chen, 1994, Acta ent. sin. 37 (2): 216, fig. 4 male genitalia. (湖南道县)

翅展 41 mm。头部与胸部暗褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须长，向上弯达胸