

图 687 徽胸须夜蛾 *Cidariplura signata* (Butler) ♂ 外生殖器

延伸成一丘突，瓣端分叉，背一枝棘形，腹一支宽钝（图 687）。

分布 湖南、江西；日本，朝鲜。

韩胸须夜蛾 *Cidariplura hani* Chen (图版 LXVII-25)

Cidariplura hani Chen, 1992, Acta ent. Sin. 35 (1): 93. (西藏波密)

Cidariplura hani: Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.364, pl. 25, fig. 19.




图 688 韩胸须夜蛾 *Cidariplura hani* Chen ♂ 外生殖器

翅展 28 mm。头部淡褐色杂黑褐色，下唇须向上伸并向后弯至后胸背面，外侧黑褐色；胸部背面淡褐色杂黑褐色，下胸淡黄褐色，足外侧黑褐色；前翅淡褐黄色，外线内方杂有部分黑褐色，外线外方大部带黑褐色，基线不明显，内线黑褐色，波曲外斜，环

纹只现一黑点，肾纹小而弯曲，黑褐色，中线暗褐色，自中室起直线内斜，外线双线黑褐色，在亚前缘脉处微外弯，其后直线内斜，亚端线淡褐黄色，不整齐锯齿形，线外侧在5—8脉处为淡褐黄区，端线由一列黑点组成，缘毛黑褐色；后翅淡黄色带黑褐色，向端区渐暗，中室有一黑点，外线双线黑褐色，较直内斜，线间黄白色，亚端线淡黄色，内侧色暗，在4脉处成一外突角，缘毛黑褐色；腹部暗褐色。

雄蛾抱器瓣端窄，背缘有一极细长突起，其端部尖，超过瓣端，抱器腹延伸成一指形突，较短，阳茎细，内囊无角状器（图688）。

分布 西藏。

奴夜蛾属 *Paracolax* Hübner

Paracolax Hübner. [1825] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 344.

Type species: *Pyralis derivalis* Hübner.

Capnistis Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 426.

Paraherminia Richards, 1932, Ent. News 43: 168.

Crinisinus Bryk, 1949, Ark. Zool. 41 (A) 1: 135.

喙发达，下唇须斜向上伸，镰刀形或弯片形，雄蛾触角线形或双栉形；前翅宽，外缘弧曲或稍外突于中部，雄蛾或有前缘褶；后翅宽，5脉发达，自中室下角前方发出。

种 检 索 表

1. 前翅白色 乐奴夜蛾 *Paracolax angulata*
前翅非白色 2
2. 前翅有一黑褐线自顶角内斜 3
前翅无黑褐线 5
3. 前翅亚端线内侧有黑带 黄肾奴夜蛾 *P. pryeri*
前翅亚端线内侧无黑带 4
4. 前翅斜线外侧黄色 斜线奴夜蛾 *P. pacifica*
前翅斜线外侧非黄色 双点奴夜蛾 *P. bipuncta*
5. 前翅亚端线直 三线奴夜蛾 *P. trilinealis*
前翅亚端线不显或只现几个暗点 6
6. 肾纹为椭圆黄斑 邻奴夜蛾 *P. contigua*
肾纹细窄 曲线奴夜蛾 *P. derivalis*

乐奴夜蛾 *Paracolax angulata* (Wileman) (图版 LXVII-26)

Adrapsa angulata Wileman, 1915, Entom. 48: 193, figs. 25, 26. (台湾阿里山)