



图 684 双带胸须夜蛾 *Cidariplura brevivittalis*
(Moore) ♂ 外生殖器

支宽，其端缘锯齿形阳茎粗长，无角状器（图 684）。

分布 广西、西藏；日本，印度，孟加拉国。

赭纹胸须夜蛾 *Cidariplura ochreistigma* (Leech)

Mastigophorus ochreistigma Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 629. (宜昌、九江、长阳)

Cidariplura ochreistigma: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415.

翅展 37 mm。头部与胸部褐色；前翅褐色，内线黑色，微波曲，稍外斜，肾纹浅黄色，窄曲，中线不显，外线黑色，外侧衬黄白色，自前缘脉后外斜，至 6 脉处折角内斜，亚端线由一系列浅黄点组成，翅外缘有一列黑点；后翅褐色，外线黑色，外侧衬黄白色，在中褶处微折曲，其后近直线内斜，亚端线由一系列浅黄点组成，端线黑色；腹部褐色。

分布 湖北、江西。

胸须夜蛾 *Cidariplura gladiata* Butler (图版 LXVII-19)

Cidariplura gladiata Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 449. (日本横浜)

Mastigophorus gladiata: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 629.

Cidariplura gladiata: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 564. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 415, pl. 71k. —Strand, 1919, Archiv Naturg. 82A (1): 149. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 191. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 141. —Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 918. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

翅展 28—32 mm。头部棕灰色，下唇须向上伸并向后弯达后胸背面，第三节扁似