



图 658 鳞篦夜蛾 *Episparis costistriga* (Walker) ♂ 外生殖器

分布 海南、云南；锡金，马来西亚。

喙夜蛾属 *Claterna* Walker

Claterna Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1543.

Type-species: *Claterna exagens* Walker.

Trigonia Guenée, 1854, Hist. nat. Ins., Noct. 4: 124.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴前额，伸达头顶，第三节细长，触角线形；胸部被粗毛；前翅外缘在6脉后稍凹；后翅外缘中部外突明显。

喙夜蛾 *Claterna cydonia* (Cramer) (图版 LXII-1)

Phalaena Geometra cydonia Cramer, 1776, Utit. Kapell. 8: 11, pl. 22, fig. F. index p. 152 (1776). (苏里南)

Claterna exagens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1543.

Focilla submemorans Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1533.

Claterna affinis Rothschild, 1915, Lep. exp. Dutch New Guinea, p. 58.

Claterna cydonia: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 544. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 369. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p.112.

翅展 43 mm。头部暗棕色，触角基节白色，额下部灰白色，下唇须第一节基部白色；胸部背面暗棕色，颈板基部带有灰白色，翅基片外缘及端部杂有少许白色，前足胫节外侧黑棕色杂有少许灰色并饰有黑棕色密毛，各足跗节外侧灰白色，第一跗节基部黑棕色；前翅暗棕色，散布黑色细点，内线白色，大波浪形外弯，环纹黑色，肾纹只现白

色细曲线，其内侧微黑，外线白色，波浪形，自前缘脉外斜至6脉折角向后，4脉后内弯，2脉后较直并成双线，前端内侧在前缘脉后有一白斑，外侧有一黑棕色大斑达亚端线，亚端线白色，前段为一白色三角形斑及一白色长点，其后微弱，翅外缘有一列黑棕色点；后翅暗棕色，外线双线白色，内一线粗，外一线中段锯齿形，自前缘外弯，至亚中褶处折向内，其后外斜，翅外缘后半部白色，端线黑棕色；腹部暗棕色，背面带有灰色，基节浅褐色，各节间有灰白色横线。

分布 海南；斯里兰卡，印度尼西亚，苏里南(?)。

本种原注模式产地为苏里南，据 Poole (1989) 认为系误注，因为此种已知只在东洋界分布。

纯夜蛾属 *Chrysopera* Hampson

Chrysopera Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 493.

Type-species: *Achaea combinans* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，贴近额前，第二节达头顶，第三节细长微弯，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛丛；胸、腹部被平滑鳞片，足胫节无刺，无长毛；前翅顶角较钝。

纯夜蛾 *Chrysopera combinans* (Walker) (图版 LXII-2)

Achaea combinans Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1399. (斯里兰卡)

Achaea quadrilunata Pagenstecher, 1890, Jahr. Nass. Natur. 43: 109.

Achaea combinans: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 165.

Chrysopera combinans: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 493. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 369.

翅展 38 mm。头部深紫棕色，触角基节有白纹，下唇须第三节细长，越过头顶；胸部背面深紫棕色，足外侧有白斑；前翅深紫棕色，内线暗棕色，模糊，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，外线暗棕色，模糊，自前缘脉后外斜，至6脉后折向内斜，亚端线隐约可见，黑褐色，自6脉后微波曲内斜，肾纹隐约可见呈一暗褐色窄纹，前缘区近顶角处有一约呈半圆形的黄斑，其中密布褐色细点，后缘衬巧克力色，斑外前端尖；后翅黑棕色，顶角一黄色大斑；前翅反面外区有一黑褐色带，其前段外侧有一模糊黄色外斜斑；腹部背面深棕色，腹面灰色。

寄主 人心果。

分布 广东、四川；印度，斯里兰卡。

立夜蛾属 *Lycimna* Walker

Lycimna Walker, 1860, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 20: 214.