

Type-species: *Gonitis distincta* Leech.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节斜而长，额平滑，上有尖毛簇，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛；胸部只有毛，无毛簇；腹部基节有毛簇；前翅顶角较尖，外缘在顶角后内削，中部外凸，4脉后内斜，7—10脉共柄，无副室；后翅3、4脉合一短柄。

红衣夜蛾 *Clethrophora distincta* (Leech) (图版XXXIX-7)

Gonitis distincta Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 506, pl. 51, fig. 7. (日本)

Gonitis virida Heylaerts, 1890, C. R. Ent. Soc. Belg. p. 30.

Clethrophora virida: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 428.

Clethrophora distincta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 535. — Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 298. — Mell, Zool. Jb. 76: 208. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 149. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322. — Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 800.

翅展42 mm左右。头部及胸部深绿色，触角红棕色，下唇须、足及下胸棕红色带灰色；前翅深绿色，中室端部有一黑点，外线淡绿色，自前缘近顶角处直线内斜至后缘，亚端线隐约可见，中部稍外弯，缘毛棕色；后翅棕红色，缘毛灰棕色。

分布 湖北、湖南、浙江、福建、云南、西藏；日本，印度。

摩夜蛾属 *Maurilia* Moschler

Maurilia Moschler, 1884, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 33 (Abh.): 298.

Type-species: *Maurilia lubina* Moschler.

Mauriliadia Berio, 1966, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria 76: 125.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，端部稍膨大，额平滑，无突起，眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部几乎全被鳞片，无毛簇；腹部基部二节背面有毛簇；前翅约呈直角形，外缘曲度平稳，有一副室；后翅3、4脉有一共短柄。

栗摩夜蛾 *Maurilia iconica* (Walker) (图版XXXIX-8)

Anomis iconica Walker, 1858 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 992. (斯里兰卡)

Maurilia iconica: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 573. — Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 441. — Swinhoe, 1918, Ann. Mag. nat. Hist. 2: pl. 1, fig. 2. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323. — Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 96.

翅展26—40 mm。头、胸黄褐色，下胸与足大部白色；前翅暗褐色，布有黑色细点，内线双线黑褐色，波曲外斜，肾纹只现一黑褐短线，外线双线黑褐色，在7脉后外