

### 黑脉邪夜蛾 *Argyospila formosa* Graeser (图版XXXVII-16)

*Argyospila formosa* Graeser, (1889) 1888, Berl. ent. Z. 32: 345. (Amurland)

*Oria extraordinaria* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 128, pl. 8, fig. 16; pl. 17, fig. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 276.

*Argyospila formosa*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 531.

翅展 30—40 mm。头、胸及前翅红棕色，颈板基部黑白相杂，翅基片中部一黑纵纹，前翅翅脉大部带黑色，中室微黑，环纹梭形，肾纹前端向前外伸近达外区，在中室上角成钩状，两纹均白色黑边，肾纹后外方另一椭圆白斑，亚中褶一黑褐纵线，2脉后一粗黑线，1脉前一黑纵条，其基部向后扩展，中室外方有放射形白纹，顶角一内斜红棕纹，翅外缘一列黑点；后翅黑褐色，前缘大部浅黄色；腹部黑灰褐色。

**分布** 黑龙江、陕西、云南、西藏；俄罗斯。

### 飘夜蛾属 *Clethrora* Hampson

*Clethrora* Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 343.

Type-species: *Leocyma pilcheri* Hampson.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴额，第三节短，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部主要被鳞片，无毛簇；前翅稍窄，有一副室；后翅宽，5脉弱，自中室横脉中下部发出；腹部基部几节背面有毛簇。

### 飘夜蛾 *Clethrora pilcheri* (Hampson) (图版XXXVII-17)

*Leocyma pilcheri* Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 512. (锡金)

*Clethrora pilcheri*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 343. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 191. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 153. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 989.

翅展 40 mm。头部、胸部及前翅淡乳黄色，下唇须黑色，颈板有二黑斑，胸部背面中部有二黑斑，后部有一黑斑，前翅基部有一黑斑，内区有 4 个黑斑，分列两行，环纹为一黑圆斑，肾纹为一黑斜圆斑，其外缘中部微外凸，外区及中区各有一列黑斑，前方的为弧形，中部的斑小，在中褶处几不可见，近顶角有一黑色三角形斑，中褶近端部有三角形小黑斑，翅外缘及缘毛有一列黑点；后翅微黑，缘毛淡乳黄色；腹部黑色，节间及臀毛簇淡乳黄色。

**分布** 湖南；锡金。