

黄黑望夜蛾 *Clytie luteonigra* Warren (图版LV-13)

Clytie luteonigra Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 338, pl. 62d. (阿富汗: W. Dinan, Amu Darya)

翅展 33 mm。头部与胸部暗灰色，密布黑色细点；前翅黄灰色，密布黑色细点，基线黑色，自前缘脉至中室，内线黑色，微波浪形外斜至中室后折向内斜，环纹只现一黑点，肾纹细窄，黑色，外线黑色，内侧衬浅褐黄色，波曲内斜，亚端线黑色，在 7 脉及 4 脉处成外凸齿，在 7 脉与亚中褶之间其内侧明显呈黑色，成三角齿状；后翅黄色，密布黑色细点，横脉纹黑色明显，端区有一黑褐色大斑，其外缘中部外凸成齿形，端线黑色；腹部灰色，有黑点。

分布 新疆；阿富汗。

月望夜蛾 *Clytie sublunaris* (Staudinger) (图版LV-15)

Pseudophia sublunaris Staudinger, 1889, Stett. ent. Zeit. p. 56. (伊塞库尔)

Clytie sublunaris: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 295, pl. 232, fig. 3. —— Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 337, pl. 62c. —— Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360.

翅展 39 mm。头部与胸部暗灰褐色杂有灰白色，足跗节外侧黑褐色，各节间有白斑；前翅淡褐色，密布黑色细点，基线黑色，较粗，自前缘脉至 1 脉，内线黑色，两侧衬灰白色，微波浪形外弯，环纹只现一黑圈，肾纹细窄，新月形，有不完整的黑边，外线黑色，内侧衬灰白色，波曲内斜，中段稍外弯，在 3 脉处稍折曲，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 7 及 4 脉处成明显外凸齿，外线与亚端线之间有一列模糊黑斑纹，端线黑色，波浪形，缘毛中有一褐线；后翅淡灰褐色，端区有模糊的黑褐色大斑，缘毛白色；腹部污褐色带灰色。

分布 新疆；中亚地区。

塞望夜蛾 *Clytie syriaca* (Bugnion) (图版LV-14)

Ophiusa syriaca Bugnion, 1837, Ann. Soc. ent. Gr. 6: 442, pl. 16, fig. 2. (叙利亚)

Ophiusa gentilitia Freyer, 1848, Neue Beitr. 6: 38.

Clytie syrdaja Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 293.

Clytie syriaca: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. p. 294——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 337. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 134.

Clytie syrdaja: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 361.

翅展 36—38 mm。雄蛾头、胸及前翅浅灰褐色，前翅有零星黑点，环纹为一黑点，肾纹暗灰色，外线微黑，亚端线暗黄色，两侧暗褐色，在 7、4 脉处外突；后翅浅褐色，