

黄黑望夜蛾 *Clytie luteonigra* Warren (图版LV-13)

Clytie luteonigra Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 338, pl. 62d. (阿富汗: W. Dinan, Amu Darya)

翅展 33 mm。头部与胸部暗灰色，密布黑色细点；前翅黄灰色，密布黑色细点，基线黑色，自前缘脉至中室，内线黑色，微波浪形外斜至中室后折向内斜，环纹只现一黑点，肾纹细窄，黑色，外线黑色，内侧衬浅褐黄色，波曲内斜，亚端线黑色，在 7 脉及 4 脉处成外凸齿，在 7 脉与亚中褶之间其内侧明显呈黑色，成三角齿状；后翅黄色，密布黑色细点，横脉纹黑色明显，端区有一黑褐色大斑，其外缘中部外凸成齿形，端线黑色；腹部灰色，有黑点。

分布 新疆；阿富汗。

月望夜蛾 *Clytie sublunaris* (Staudinger) (图版LV-15)

Pseudophia sublunaris Staudinger, 1889, Stett. ent. Zeit. p. 56. (伊塞库尔)

Clytie sublunaris: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 295, pl. 232, fig. 3. — Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 337, pl. 62c. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360.

翅展 39 mm。头部与胸部暗灰褐色杂有灰白色，足跗节外侧黑褐色，各节间有白斑；前翅淡褐色，密布黑色细点，基线黑色，较粗，自前缘脉至 1 脉，内线黑色，两侧衬灰白色，微波浪形外弯，环纹只现一黑圈，肾纹细窄，新月形，有不完整的黑边，外线黑色，内侧衬灰白色，波曲内斜，中段稍外弯，在 3 脉处稍折曲，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 7 及 4 脉处成明显外凸齿，外线与亚端线之间有一列模糊黑斑纹，端线黑色，波浪形，缘毛中有一褐线；后翅淡灰褐色，端区有模糊的黑褐色大斑，缘毛白色；腹部污褐色带灰色。

分布 新疆；中亚地区。

塞望夜蛾 *Clytie syriaca* (Bugnion) (图版LV-14)

Ophiusa syriaca Bugnion, 1837, Ann. Soc. ent. Gr. 6: 442, pl. 16, fig. 2. (叙利亚)

Ophiusa gentilitia Freyer, 1848, Neue Beitr. 6: 38.

Clytie syrdaja Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 293.

Clytie syriaca: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. p. 294—Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 337. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 134.

Clytie syrdaja: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 361.

翅展 36—38 mm。雄蛾头、胸及前翅浅灰褐色，前翅有零星黑点，环纹为一黑点，肾纹暗灰色，外线微黑，亚端线暗黄色，两侧暗褐色，在 7、4 脉处外突；后翅浅褐色，

亚端区一黑色宽带，端区灰黑色。雌蛾头、胸灰杂少许黑色，前翅灰色密布黑点，环纹黑色，肾纹“8”字形，外线黑色稍外弯，亚端线在7脉处外突，内侧有一黑三角形斑；腹部浅黄褐色。

分布 新疆、内蒙古；亚洲西部。

同纹夜蛾属 *Pericyma* Herrich-Schäffer

Pericyma Herrich-Schäffer, 1851, Syst. Bear. Schmett. Eur. p. 429.

Type-species: *Acidalia albidentaria* Freyer.

Alamis Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 3.

Dugaria Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1075.

Moepa Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 981.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节相当长，额平滑，有小毛簇，复眼圆大；胸部毛鳞混生，前、后胸有扩展的毛簇；雌蛾前足胫节饰毛很宽，中后足胫节微饰毛，前、后足胫节无刺；腹背有系列毛簇，在第三、四节上最大；前翅顶角圆形，外缘曲度平稳，略成锯齿形；后翅中室约为翅长之半。

种 检 索 表

雄蛾触角近中部膨大，腿节与胫节饰长毛…………… 凤凰木同纹夜蛾 *Pericyma cruegeri*
 雄蛾触角近中部不膨大，足饰毛中常…………… 同纹夜蛾 *P. albidentaria*

凤凰木同纹夜蛾 *Pericyma cruegeri* (Butler) (图版LV-16)

Homoptera cruegeri Butler, 1886, Trans. ent. Soc. Lond. p. 411. (澳大利亚)

Pericyma cruegeri: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 299. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: pl. 55g. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 361. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.336.

翅展 33—42 mm。头部灰褐色，雄蛾触角中段膨大，下唇须褐白色，外侧褐色；胸部背面灰褐色，颈板有两条褐色横线，下胸赭白色，足跗节外侧黑褐色，各节间有褐白斑；前翅灰褐色或棕褐色，基线黑色，波浪形，自前缘脉内斜至1脉，内线黑色，波浪形内斜，基线与内线之间及内线外侧带有红褐色，翅中区有4条与内线平行的黑棕色波浪形线，肾纹棕褐色，有不完整的灰白边，两侧中凹，外线黑色，自前缘脉波曲外弯，在中褶处内凸，自4脉后内斜，外侧有一隐约的褐线，亚端线淡浅黄褐色锯齿形，外线与亚端线间有一灰黑窄带，在前缘区有一暗褐斑；后翅灰褐色，中、外线均双线黑棕色波浪形，亚端线双线黑色，端线褐色，内方另一衬白的黑波浪形线；腹部灰褐色，第三、四、五节有黑毛簇。