

*Palpangula christophi*: John, 1909, Rev. russe Ent. 9: 118.

翅展 32 mm。头部与胸部白色杂有黑褐色，触角干背缘有黑横纹，额两侧各有一扁三角形黑斑，下唇须第二节前半外侧黑色杂少许白色，翅基片内缘黑色，足外侧杂黑色，前足跗节前半有黑斑，后三节黑色，中足第二跗节有黑条，后三节黑色，后足跗节端部黑色；前翅白色，各翅脉间及部分翅脉黑灰色，外区前半及亚端区的各翅脉间有黑纵纹，前缘区基部有一白心梭形黑纹，亚中褶基部有一黑纵纹，剑纹窄长，白色黑边，环纹小，白色，肾纹斜曲，白色，内侧有黑边，环纹与肾纹间有一白线相连，其前后均衬黑色并沿环纹前后缘内伸至近中室基部，环纹前方的前缘脉有一黑斜纹，亚端线白色，自前缘脉近端部内斜至 5 脉折角外突于 4 脉，其后内斜至亚中褶成一内突齿，此处内侧与肾纹间黑色，1 脉后有一列黑纵纹，缘毛黑褐间白色；后翅白色，端区带有黑褐色，中室端部有一圆形黑斑；腹部白色，背面带有褐色，腹面布有黑色细点。

分布 新疆；中亚地区。

## 残夜蛾属 *Colobochyla* Hübner

*Colobochyla* Hübner, [1825] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 344.

Type-species: *Pyralis salicalis* [Denis et Schiffermüller].

*Madopa* Stephens, 1829, Syst. Cat. Br. Ins. 2: 159.

*Colobochila* Agassiz, 1946, Nom. zool. Index Univ. p. 94.

喙发达，额平滑，有毛簇，下唇须斜向前伸，第二节被密鳞，第三节短钝；胸部及腹部鳞片平滑；雄蛾触角有纤毛；前翅外缘曲度平稳，斑纹简单。幼虫第三对腹足发育不全；作薄茧化蛹。

### 残夜蛾 *Colobochyla salicalis* (Denis et Schiffermüller) (图版 LXIV-5)

*Pyralis salicalis* [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 122. (奥地利)

*Phalaena obliquata* Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3: 185.

*Colobochyla laetalis*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 169.

*Colobochyla salicalis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 398. —Forster, et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 301. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 888. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375. —Bretherton et al., 1983, Br. Moths & Butterflies, 10: 377. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1030.

翅展 23 mm。头部与胸部灰褐色；前翅褐灰色，内线暗褐色，在前缘脉后折角直线内斜，外侧衬黄色，中线褐色，内侧衬黄色，较直内斜，在中褶与亚中褶处微内弯，一褐线自顶角微曲内斜至翅后缘近臀角处，内侧衬黄色，此线及中线外方均带有暗褐灰色，近翅外缘有一列黑点，翅外缘深棕色；后翅淡褐黄色，端区色较暗，隐约可见暗棕

色亚端线，自3脉至臀角，内侧衬黄色，翅外缘有一列褐色细纹，缘毛浅黄色，中有一模糊褐线；腹部淡褐灰色。

**寄主** 杨、柳。

**分布** 黑龙江、辽宁、新疆、河北、山东、河南、福建；欧洲，伊朗，土耳其，日本。

## 戚夜蛾属 *Paragabara* Hampson

*Paragabara* Hampson, 1926, Descr. new Gen. Spec. Ldp. Noct. Br. Mus. p. 260.

Type-species: *Madopa flavomacula* Oberthür.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达头顶，端部有一尖毛簇，中部上缘饰毛，第三节短，被密鳞，额光滑无突起，上部有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，有鬃毛；胸部背面几全被鳞，无毛簇，前足腿节端部有毛簇，中足胫节膨大，有一褶，内含长毛簇；前翅顶角稍尖，有一副室，后翅中室长约为翅长之半，5脉发达，起自中室下角之前；腹部基节背面有毛簇。

### 戚夜蛾 *Paragabara flavomacula* (Oberthür) (图版 LXIV-6)

*Madopa flavomacula* Oberthür, 1880, Et. ent. 5: 87, pl. 4, fig. 5. (Askold 岛)

*Colobochyla flavomacula*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 398. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 375.

*Paragabara flavomacula*: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 181. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 889.

翅展 16—20 mm。头部橙黄色，下唇须第二节背缘饰较长鳞片；颈板橙黄色；胸部背面灰褐色；前翅灰褐色，内线褐色，较直内斜或微外弯，外侧衬灰白色，环纹不显，肾纹橙黄色，细窄，内缘褐色，外线白色，内侧衬褐色，自前缘脉微曲外斜至7脉，折角内斜，亚端线褐色，在7脉及2—5脉间外弯，外线与亚端线间的前缘脉上有几个白点；后翅灰褐色，端线褐色；腹部黄褐色。

**分布** 黑龙江、河北、江苏；日本，朝鲜。

## 勒夜蛾属 *Laspeyria* Germar

*Laspeyria* Germar 1810, Diss. sistens Bombycum Spec. p. 13.

Type-species: *Bombyx flexula* [Denis et Schiffermüller].

*Laspeyresia* R. L. 1817, Jen. Allg. Lit.-Ztg. 1: 288.

*Colposia* Hübner, [1823] 1816, Verz bek. Schmett. p. 287.