

Corgatha nitens: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 291. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 805. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 327.

翅展 15 mm。头、胸及腹部浅红棕色；前翅浅赭色微带紫红，内线、外线细弱，黑色，中线为模糊黑影，仅后半可见较直内斜，外区前缘有三个白点，点间有黑纵纹，亚端线白色，内侧衬黑色，在 3、4 脉处为外突齿，端区布有细黑点，翅外缘一列黑点；后翅黄褐色带紫红，中、外线暗褐色，前者模糊，较直内斜，端线褐色。

寄主 地衣。

分布 江苏、江西；日本。

双线孔夜蛾 *Corgatha diplochorda* Hampson (图版 XL-42)

Corgatha diplochorda Hampson, 1907, J. Bomb. nat. Hist. Soc. 17: 649. (印度)

Corgatha diplochorda: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 293. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 256. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 327.

翅展 20 mm。头部与颈板棕色；胸部背面淡褐黄色，下胸与足赭黄色带褐色；前翅淡褐黄色，布有黑色细点，端区色较暗，环纹只现一黑点，肾纹由 3 个黑点组成，中线褐色双线，自中室下角内斜至翅后缘，外线双线褐色，自前缘脉至 4 脉间极微弱，6 脉之前外斜，其后内斜，在 4 脉处稍外凸，亚端线由不清晰的褐纹组成，在 4 脉后内斜，翅外缘内侧有一列黑点，缘毛深红棕色，基部有一浅褐黄线，端部黑色；后翅淡褐黄色，带有赤褐色，端区色较深，并布有细黑点，横脉纹为一黑点，外线双线褐色，内一线较黑，亚端线双线褐色，细波浪形，翅外缘内侧有一列黑点，端线褐色，缘毛赤褐色，基部有一黄白线；腹部淡褐黄色，背面布有少许黑鳞。

分布 四川、云南；印度。

灰颈孔夜蛾 *Corgatha concavata* (Walker) (图版 XL-43)

Sophta concavata Walker, [1863] 1862, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 36: 1759. (澳大利亚)

Nacerasa nana Walker, 1866, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 35: 1571.

Corgatha concavata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 295, text fig. 89. —Holloway, 1979, Lep. New Caledonia p. 430, pl. 78: 5; fig. 104: 3.

Sophta concavata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 256, pl. 23i.

翅展 22 mm。头部与胸部灰色带褐色，布有少许黑点；前翅灰色带红褐色，布有黑细点，中室基部有一黑点，内线双线黑色线间灰色，细波浪形内斜，肾纹不清晰，中央一褐纹，外围褐色，近圆形，肾纹前方褐色雾状，并扩展至顶角，外线双线褐色，自前缘脉外斜至 6 脉折向内斜，4 脉后内弯，亚端线灰色，细波浪形，中段外弯，线两侧各有一列暗褐纹，端线褐色；后翅灰色带红褐色，布有黑色细点，横脉纹黑色，外线双线褐色，近呈直线内斜，线间灰白色，亚端线褐色细弱，翅外缘有一列黑点；腹部灰色

带褐色。

分布 海南；澳大利亚。

白纹孔夜蛾 *Corgatha costipicta* Hampson (图版 XL-44)

Corgatha costipicta Hampson, 1895, Trans. ent. Soc. Lond. p. 300. (锡金)

Corgatha costipicta: Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 519. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 299, pl. 157, fig. 24.

Palara costipicta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 259, pl. 25n.

翅展 16 mm。头部与胸部黄白色带红褐色，触角干基部白色，两触角间有一白纹，下唇须与额红褐色；前翅黄白色带浅红褐色，布有零星黑细点及银鳞，前缘区内半白色，基线仅前缘区现一黑点，内线黑色，前端为黑点状，稍内斜，肾纹只现一褐点，外线褐色，内侧衬白色，外弯，4脉后内弯，前缘脉上为一黑点，亚端线白色，波浪形，外侧各翅脉间有褐纹，翅外缘有一列黑点，缘毛桔黄色；后翅淡红褐色，布有零星银鳞，横脉纹褐色，外线褐色，波浪形，外侧衬白色，亚端线黄白色，细波浪形，外侧有一列褐纹，翅外缘有一列黑点，缘毛桔黄色；腹部白色带褐色。

分布 云南；锡金。

缘斑孔夜蛾 *Corgatha costinotalis* (Moore) (图版 XL-45)

Hypena costinotalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 83. (大吉岭)

Corgatha costinotalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 347. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 304. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 260, pl. 231. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 327. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 287.

翅展 21 mm。头部赤褐色，触角黑色，近基部有白色环纹，头顶白色；胸部背面赤褐色，下胸黄白色；前翅赤褐色，布有暗褐色细点，前缘区基部有一近圆形白斑，内线黑色，在前缘区为一近圆形白斑，其后波曲内斜，中室端部有一微黑色纹，外线在前缘区为一近三角形白斑，其后为黑色细线，细波浪形外弯至4脉，其后内弯，亚端线隐约可见黑色，波浪形，间断为点列，翅外缘有一列黑点；后翅赤褐色，布有黑色细点，外线黑色，不明显，波浪形，在各翅脉上为黑点，亚端线隐约可见，微黑，翅外缘有一列黑点。

分布 西藏；锡金。

白斑孔夜蛾 *Corgatha costimacula* (Staudinger) (图版 XL-46)

Aventiola (Aventina) costimacula Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 604, pl. 14, fig. 4. (西伯利亚：Baran, Sutschan 地区)